

Primary Panel (Front):

UN EXTERMINATEUR EN BOUTEILLE

SUREKILLER

BUG BUSTER

POUDRE INSECTICIDE

DOMESTIQUE

CONTENU NET: 300g

NE TACHE PAS

SANS ODEUR

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

SECONDARY PANEL (BACK):

LE SUREKILLER BUG BUSTER tue les insectes, si utilisé de la manière indiquée.

MODE D'EMPLOI: Saupoudrer une quantité de poudre aux endroits où les blattes, fourmis, et lépismes argentés se retrouvent incluant derrière ou en dessous des machines à laver, des tuyaux d'eau chaude, des éviers de cuisine et des poubelles, en une petite fine couche au-dessus des surfaces, dans les fissures et les crevasses. Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants, ne pas utiliser dans les gardes-mangers, ou d'autres endroits où la nourriture, les ustensiles ou les boissons peuvent être contaminés. Répéter l'opération selon le besoin. Les insectes prennent environ 10 jours à mourir. Ne pas enlever la poudre jusqu'à ce que tous les insectes aient été réprimés. Bien fermer le contenant après usage et l'entreposer le dans un endroit frais et sec.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Nocif si avalé. N'en respirer pas la poussière. Éviter d'en répandre sur les racines ou les plantes.

ÉLIMINATION: Ne pas utiliser le contenant à d'autres fins; le jeter aux ordures ménagères.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion: appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalé. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Si la poudre a été en contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Si le produit entre dans les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))