

ECTOgard™
Carton (French)

ECTOgard^{MC}

PLAQUETTES D'OREILLE INSECTICIDE POUR BOVINS

Pour supprimer les mouches des cornes et réduire les mouches faciales des bovins laitiers et de boucherie.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AGRICOLE

No D'ENREGISTREMENT 22880 - LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE : Tétrachlorvinphos.....14,0 % p/p

Ce produit contient 27,5 % adipate de Di-(2-éthylhexyle), produit identifié comme étant possiblement toxique.

Avertissement: contient l'allergène soya

POIDS NET : 16,5 g par plaquette

CONTENU : 20 plaquettes par boîte

Elanco Canada Limited

1919 Minnesota Court, Suite 401

Mississauga, Ontario L5N 0C9

1-800-265-5475

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et la bouche. Bien se laver à l'eau et au savon après la manipulation et avant de manger et de fumer. Porter une seule couche de vêtements et des gants résistant aux produits chimiques lorsque vous manipulez les plaquettes d'oreilles.

- Entreposer loin des aliments pour les humains ou les animaux dans un endroit frais.
- Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau en y jetant les plaquettes.
- Enlever les plaquettes à la fin de l'été, avant l'abattage.

ÉLIMINATION :

Les plaquettes et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux règlements municipaux et provinciaux.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Le tétrachlorvinphos est un inhibiteur de la cholinestérase. Voici des symptômes typiques d'une surexposition aux inhibiteurs de la cholinestérase: les maux de tête, la nausée, les étourdissements, la transpiration, la salivation et l'écoulement nasal et oculaire. Dans les cas graves, les symptômes peuvent évoluer et prendre la forme de contractions musculaires, de faiblesses, de tremblements, de perte de coordination, de vomissements, de crampes abdominales et de diarrhée. Lorsque l'intoxication constitue un danger de mort, on remarque chez la victime la perte de conscience,

47 l'incontinence, des convulsions et une dépression respiratoire qui s'accompagne
48 d'effets cardiovasculaires. Il faut traiter les symptômes. S'il y a eu exposition, les
49 analyses de la cholinestérase plasmatique et globulaire peuvent donner une idée du
50 degré d'exposition (il est utile, à cette fin, de disposer de données repères). L'antidote
51 à privilégier est l'atropine, et uniquement par injection. Les oximes, par exemple le
52 chlorure de pralidoxime, peuvent exercer un effet thérapeutique s'ils sont administrés
53 tôt. Cependant, il faut les administrer uniquement en conjonction avec l'atropine. Dans
54 les cas d'intoxication aiguë et grave, il faut recourir aux antidotes immédiatement
55 après avoir pratiqué une intubation et rétabli la respiration. S'il s'agit d'une exposition
56 par voie orale, la décision de provoquer ou non le vomissement doit être prise par le
57 médecin traitant.

58 **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux
59 à l'eau. En cas de contact avec la peau, bien se laver à l'eau et au savon. Si des
60 signes de maladie se manifestent après avoir léché ou mâché des plaquettes
61 d'oreilles insecticides, consulter un médecin. Emporter le contenant, l'étiquette ou
62 prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à
63 obtenir une aide médicale.

64
65 **MODE D'EMPLOI** : Appliquer la plaquette au moyen du système Allflex au moment
66 où apparaissent ces mouches, au printemps. Pour une efficacité optimale, employer
67 2 plaquettes par animal. Remplacer au besoin. Délai d'attente non nécessaire entre
68 les traitements et l'abattage. Éviter de traiter les veaux de moins 6 mois. Retirer les
69 plaquettes à la fin de l'été, avant l'abattage.

70 **Figure 1 - PORTER DES GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES**
71 lorsque vous manipulez les plaquettes d'oreilles. Mettre la plaquette sous l'agrafe
72 en appuyant sur le levier. La tige doit pointer vers le bas.

73 **Figure 2 –** Enforcer complètement le bouton sur la tige. La plaquette et le bouton
74 sont alors prêts pour la pose.

75 **Figure 3 -** Les pinces de pose et chaque plaquette doivent être désinfectées avant la
76 pose. La pose de plaquettes non désinfectées peut entraîner une infection et une
77 inflammation dans la région de la perforation. Poser la plaquette en perçant l'oreille à
78 mi-chemin entre la tête et le bout de l'oreille, entre la 2e et la 3e nervure. Ne pas
79 enfoncer la tige du bouton dans la nervure ou une veine.

80 **Figure 4 -** Si la plaquette est bien en place, elle pend tel qu'illustré.

81
82 **AVIS À L'UTILISATEUR** : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement
83 selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce
84 mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.
85 L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux
86 biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

87
88 Ectogard, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou
89 de ses sociétés affiliées. ©2022 Elanco ou ses sociétés affiliées.

90
91 <Elanco Logo>