

2011-5913

2011-12-08

BUGCON TOTAL EXTERMINATOR
SOLUTION INSECTICIDE RÉSIDUELLE

Tue fourmis, blattes, grillons, lépismes argentés, araignées, cucujides dentelés des grains (stade exposés), perce-oreilles, puces, millipèdes, tétranyques du trèfle, cloportes communs, tiques sanguines-

NO. D'HOM. 20742 LOI. P. A.
GARANTIE PROPOXUR 1.5%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DOMESTIC CONTENU NET 2 L
DANGER POISON

Alberta Aerosol-Gillex
1571 Sandhurst Cr.
P.O. Box 63529 Woodside Sq. Mall
Agincourt. On. M1V 1V0 (AAG-2)
Web: www.bugcon.com
Mail: glx@bugcon.com

MODE D'EMPLOI:

Pour le traitement des fissures, crevasses ou des endroits infestés seulement. Vaporiser les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient bien humectées. Ne pas vaporiser sur les humains, les plantes ou les animaux domestiques. Ne pas laisser les enfants ou les animaux entrer en contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas complètement séchées.

USAGE INTÉRIEUR: AIRE DE PRODUCTION NON-ALIMENTAIRE:

BUGCON TOTAL EXTERMINATOR tue fourmis, blattes, grillons, lépismes argentés, araignées, cucujides dentelés des grains (stade exposé). Appliquer par jets mouillés et épais dans les endroits de reproduction et de rassemblement d'insectes et sur les surfaces exposées à proximité.

Vaporiser dans les fissures, crevasses autour des plinthes et dans les autres endroits où ces insectes se cachent. Appliquer derrière et en-dessous des armoires, réfrigérateurs, évier, cuisinières et à l'intérieur et autour des poubelles. Répéter dans 7 à 14 jours ou lorsque nécessaire. Ne pas contaminer les aliments ou les plantes décoratives. Éviter de contaminer la nourriture, les ustensiles de cuisine et les endroits où la nourriture est préparée. Ne pas vaporiser où les aliments sont préparés et entreposés.

USAGE À L'EXTÉRIEUR: BUGCON TOTAL EXTERMINATOR tue fourmis, araignées, grillons, perce-oreilles, puces, millipèdes, tétranyques du trèfle, cloportes communs, tiques sanguines.

Vaporiser complètement les endroits infestés y compris les surfaces extérieures des moustiquaires, portes, encadrements de fenêtres, fondations, patios ou autres endroits où les insectes peuvent pénétrer. Pour les fourmis, vaporiser les passages, et les fourmilières et les endroits par lesquels les fourmis pénètrent à l'intérieur. Répéter aussi souvent que nécessaire. Ne pas vaporiser sur la végétation. Éviter de trop humecter le plastique, le caoutchouc et les surfaces d'asphalte telles que les tuiles et les revêtements de planchers.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INFLAMMABLE. Ne pas utiliser en présence de feu ou d'étincelles. Ne pas fumer pendant l'emploi. Ne pas vaporiser en direction des yeux. Dangereux si avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs et s'assurer d'une ventilation adéquate. Ne pas utiliser comme vaporisateur d'espace. Éloigner les animaux domestiques et recouvrir les aquariums avant la vaporisation.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si avalé, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom de produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient du propoxur. Le propoxur est un inhibiteur de la cholinestérase carbamique. Le sulfate d'atropine est un antidote. En cas d'empoisonnement avoir recours à l'oxygénothérapie et administrer un traitement symptomatique. Contient des distillats de pétrole.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter dans les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))