

SERGEANT'S
POUDRE ANTI-PUCES
ET TIQUES POUR CHATS

Action résiduelle pour une élimination rapide.

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Carbaryl.....5,0 %
Pyréthrines0,1 %
Butoxyde de pipéronyle1,0 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
N'UTILISER QUE SUR LES CHATS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOL. 22116 L.P.A.

CONTENU NET 150 g

Sergeant's Pet Care Products, Inc.
2625 South 158th Plaza
Omaha (NE) 68130
ÉTATS-UNIS

SERGEANT'S POWDRE ANTI-PUCES ET TIQUES POUR CHATS

MODE D'EMPLOI : Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Saupoudrer abondamment le produit sur l'animal en commençant par la tête et en progressant vers l'arrière du corps. S'assurer que la poudre atteint la peau, y compris sur les pieds et les pattes. Ne pas traiter ou mettre en contact avec les yeux, le visage ou les parties génitales. Ne répéter le traitement que si le problème persiste.

Ne pas utiliser cette poudre plus d'une fois par semaine. Ne pas utiliser ce produit sur des animaux âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème pour l'animal.

PRÉCAUTIONS : PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'inhalation ou d'ingestion. Éviter de respirer les poussières. Éviter de laisser le produit entrer en contact avec la peau. Porter des gants de caoutchouc durant l'application de ce produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve la nourriture. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Les applications répétées peuvent produire une irritation cutanée ou nasale chez les animaux sensibles. En l'occurrence, cesser l'utilisation. Ne PAS utiliser ce produit sur les chats en même temps que le traitement avec (ou l'exposition à) d'autres pesticides, médicaments ou produits chimiques inhibiteurs de la cholinestérase ou dans les 30 jours avant ou après ce traitement (ou cette exposition).

Toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

PREMIERS SOINS : PERSONNES : CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.