

ISOMATE®-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE
PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE POUR UTILISATION SUR LES POMMIERS ET
POIRIERS
AGRICOLE

| | | |
|------------------|---------------------------|---------|
| GARANTIE: | E, E-8,10-Dodécadièn-1-ol | 52,96 % |
| | 1-Dodécanol | 29,73 % |
| | 1-Tétradécanol | 6,04 % |

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 22899 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AVERTISSEMENT : IRRITANT CUTANÉ

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 400 diffuseurs par paquet (chaque diffuseur contient 205 mg de phéromone; pour un total de 82 g de phéromone par paquet)

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

14615 NE 13th Court, Suite A
Vancouver, Washington 98685 E-U
Téléphone: 360-571-2247

MODE D'EMPLOI

IL EST TRES IMPORTANT QUE LA ISOMATE-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE SOIT APPLIQUÉ TEL QU'INDIQUÉ.

Les producteurs utilisant ce produit doivent maintenir des registres détaillés des dommages encourus à l'intérieur de leur verger. Il est important d'enlever et de détruire tous les fruits infestés sur les arbres au sol et aussi d'appliquer des bandes autour des troncs dans les parties les plus infecté en bordure du verger. Le dépistage précis des populations adultes est essentiel puisque le mode d'utilisation de la ISOMATE-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE est très différent du mode d'utilisation des insecticides conventionnels à large spectre homologué pour le contrôle de la carpocapse de la pomme. La réussite du programme de lutte avec ISOMATE-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE dépend de la discussion continue avec les experts en lutte intégrée les conseillers horticoles et les représentants des compagnies de produits antiparasitaires.

CULTURES: Pomme et poire.

PARASITE: Carpocapse de la pomme (*Cydia pomonella*).

DOSE D'EMPLOI: 1000 diffuseurs à l'hectare (400 diffuseurs à l'acre). Doubler la dose de diffuseurs en bordure du verger.

APPLICATION: Attacher le diffuseur sur une branche située au moins dans le tiers supérieur de l'arbre, de préférence à 0,7-1 mètre de la cime. Il est important de placer les diffuseurs à l'intérieur de la voûte de feuillage le plus à l'ombre possible. Les diffuseurs doivent être appliqué la façon uniforme dans les zones traitées. Les diffuseurs doivent être attachés solidement à des branches qui ne seront **pas** coupées durant la taille de l'hiver prochain. **Durant l'installation, faire attention de ne pas attacher les diffuseurs trop serrés pour éviter des plaies d'étranglement.**

PÉRIODE D'UTILISATION: Installer les diffuseurs avant l'émergence des papillons adultes au printemps. Les diffuseurs libèrent de la phéromone pendant 120 à 140 jours dépendamment de la température. Dans les cultures nécessitant une longue saison de croissance ou dans les vergers fortement infestés, une deuxième application est recommandée.

NOTE: ISOMATE-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE prévient l'accouplement de la carpocapse de la pomme. Toutefois, si un grand nombre de femelles déjà fécondées de la même espèce sont présentes aux alentours du verger traité, le déplacement de ces femelles peut réduire de façon significative le niveau de contrôle obtenu. Les pommiers, poiriers, cognassiers, pommeliers et autres espèces ôte non traités dans un rayon de 300 mètres peuvent servir de sources de contamination pour le verger traité. Les mesures à prendre pour contrer ce problème sont les suivantes:

- Traitement de vergers entiers et non seulement des parties de grands blocs traités de façon conventionnelle qui servent souvent de sources de contamination de femelles fécondées.
- Traitement des vergers représentant des sources de contamination avec la ISOMATE-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE (par exemple une bande d'au moins 50 mètres de large le long du verger traité).
- Traitement des arbres sources de contamination avec un insecticide homologué.
- Traitement avec un insecticide homologué de 4 à 6 rangés le long du verger traité avec la phéromone.

Des applications supplémentaires d'insecticides homologués sont recommandées lorsque la ISOMATE-C PLUS CARPOCAPSE DE LA POMME PHÉROMONE est utilisée pour le contrôle de fortes populations de carpocapse de la pomme. Tous les insectes nuisibles doivent être suivis de façon à ce que des insecticides conventionnels puissent être appliqués au moment opportune.

ISOMATE® est une marque déposée de "Pacific Biocontrol Corporation".

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N'ouvrir les enveloppes de feuille d'argent que lorsque prêt à utiliser. Éviter tout contact avec les yeux. Pendant la manipulation du produit porter des gants et des lunettes de protection résistant aux produits chimiques. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après manipulation du produit.

PREMIERS SOINS:

Provoque l'irritation cutanée. NE PAS laisser entrer en contact avec la peau.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Laver la peau exposée avec du savon et beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver séparément avant de les porter à nouveau. Si l'irritation persiste ou est sévère, consulter un médecin.

CONTACT OCULAIRE: Tenir l'œil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l'eau. Si nécessaire, enlever les verres de contact et continuer à rincer. Si l'irritation persiste ou est sévère, consulter un médecin.

Apporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement selon la loi sur les produits antiparasitaires avec vous lors de la consultation médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

**Éviter la contamination des produits destinés à la consommation humaine et animale lors de l'entreposage ou l'élimination des diffuseurs utilisés ou non.
Ne pas jeter les diffuseurs, utilisés ou non, dans ou près des étendues d'eau.**

ENTREPOSAGE:

Entreposer les paquets de diffuseurs non-ouverts à une température inférieure à 4°C dans un endroit sec.

ÉLIMINATION:

Les diffuseurs inutilisés qui ne peuvent pas être appliqués selon le mode d'emploi doivent être éliminés selon la réglementation provinciale en vigueur.

ÉLIMINATION DES RÉCIPIENTS:

Les diffuseurs usagés et les enveloppes de feuille d'argent doivent être éliminés selon la réglementation provinciale en vigueur. Les enveloppes de feuille d'argent peuvent être mis au rebut avec les déchets domestiques.

GÉNÉRAL:

Pour plus d'information sur l'élimination de produits inutilisés ou superflus, veuillez vous adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial approprié. Communiquer avec le fabricant et l'organisme de réglementation provincial approprié en cas de déversement et pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))