

WILSON®
LIQUIDE BOULLIE SOUFRÉE⁽¹⁾
INSECTICIDE/FONGICIDE

Solution

Pour arbres fruitiers, rosiers et autres plantes d'ornement.
Pour la saison dormante comme pour l'été.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 23782 LOI P.A.

GARANTIE : polysulfure de calcium 23 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX

500 mL (1 L, 2 L)

Sure-Gro IP Inc.,
CP 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

Décoller pour mode d'emploi
PRESSER POUR RESCELLER

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT DE L'UTILISER. La Bouillie Soufrée devrait surtout être employée comme PULVÉRISATION DE DORMANCE pour éliminer les insectes hivernants et les infections. Durant l'été, d'autres applications de Bouillie Soufrée ou bien d'insecticides ou de fongicides de Wilson® seront nécessaires pour garder les plantes libres de parasites. La Bouillie Soufrée ne peut être mélangée qu'à de l'Huile pour stade dormant de Wilson®, à l'exclusion de tout autre produit. Utiliser avec pulvérisateur manuel ou dorsal ou traitement localisé. Ne pas l'utiliser lorsque la température a presque atteint ou a déjà atteint 27 °C ou plus. Agiter la solution d'arrosage durant la pulvérisation. La Bouillie Soufrée tache le bois peint, la brique et la pierre. Empêcher ce produit de geler. Ne pas appliquer par voie aérienne. **ARBRES FRUITIERS :** Comme pulvérisation de dormance, l'appliquer avant l'éclosion des bourgeons pour supprimer les phytoptes, les kermès, les cochenilles du pêcher, les oeufs de tétranyques rouges, les oeufs de pucerons, les perce-rameaux, le nodule noir du prunier et la cloque du pêcher. Utiliser 100 mL de Bouillie Soufrée par litre d'eau. **POMMIERS ET POIRIERS :** Durant l'été, l'employer à raison de 15 mL (1 cuillerée à soupe) par litre d'eau juste avant puis juste après la floraison, afin d'enrayer le blanc et la tavelure; répéter ce traitement de 10 à 20 jours après la fin de la floraison. Ne pas l'utiliser sur les pruniers en feuilles, ni jamais sur les abricotiers. La variété "Délicieuse" de pommes peut être endommagée par une pulvérisation de Bouillie Soufrée en été. **FRAMBOISIERS, MÛRIERS ET RONCES DE LOGAN :** Pour enrayer la rouille, l'antracnose, la brûlure de la tige et des dards, appliquer la Bouillie Soufrée à raison de 100 mL par litre d'eau juste au moment de l'éclosion des bourgeons. **GADELIERS ET GROSEILLERS :** Pour enrayer le blanc, le mildiou, la rouille et les cochenilles, en appliquer 100 mL par litre d'eau juste avant l'éclosion des bourgeons. En utiliser 60 mL (4 cuillerées à soupe) par 3 litres d'eau juste avant l'ouverture des fleurs et répéter ce traitement à chaque semaine après la floraison jusqu'à ce que les fruits tournent (se colorent). On peut l'utiliser jusqu'à la veille de la cueillette. **ROSIERS :** Pour enrayer les cochenilles du rosier, le chancre et la tache noire, effectuer une application au stade dormant, juste avant l'éclosion des bourgeons, avec 100 mL de Bouillie Soufrée par litre d'eau. Pour combattre la tache noire, le blanc et le mildiou durant l'été, en employer 5 mL (1 cuillerée à thé) par 3 litres d'eau à des intervalles de 1 à 2 semaines. **ARBRES ET ARBUSTES :** Pour enrayer les cochenilles sur l'écorce et les aiguilles, ainsi que les phytoptes de l'érable, effectuer un traitement au stade dormant avec 100 mL par litre d'eau. Pour enrayer les pucerons à galle allongée de l'épinette, en employer 30 mL (2 cuillerées à soupe) par litre d'eau. **PULVÉRISATION DE DORMANCE COMBINÉE :** Arbres fruitiers, rosiers et plantes ornementales à feuilles caduques. Pour enrayer les insectes hivernants, les oeufs, les cochenilles virgules, les cochenilles de San José, les cochenilles du rosier, les cochenilles noires, ainsi que les maladies fongiques hivernantes, mélanger 120 mL (8 cuillerées à soupe) de Bouillie Soufrée de Wilson® et 60 mL (4 cuillerées à soupe) d'Huile pour stade dormant de Wilson® par 3 litres d'eau.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion. CORROSIF pour les yeux. NE DOIT PAS entrer en contact avec les yeux. Éviter tout contact du produit avec la peau. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques (en caoutchouc) au cours de la manipulation. Se laver après l'avoir employé. Éviter de tacher les vêtements et la peau.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau et les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : TOXIQUE pour les organismes aquatiques.

ÉLIMINATION : Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. www.wilsonproducts.ca

® Sure-Gro Holdings Inc. / Lic. Sure-Gro

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.