

WILSON
POUDRE CONTRE PUCES ET TIQUES

Élimination rapide avec action résiduelle

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET CHATS
TUE LES PUCES DU CHIEN ET DU CHAT, LES TIQUES AMÉRICAINES
DU CHIEN ET LES TIQUES SANGUINES

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 21296 LOI P.A.

GARANTIE :

carbaryl	5,0 %
pyréthrines	0,1 %
butoxyde de pipéronyle	1,0 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

100 g (200 g)

Sure-Gro IP Inc.
P.O. Box 21001
Brantford ON
N3R 7W9

MODE D'EMPLOI : Ne PAS administrer par la gueule. Saupoudrer abondamment sur tout l'animal, en commençant par la tête pour aller vers l'arrière. Veiller à ce que la poudre atteigne

la peau, même sur les pattes et les pieds. Ne pas traiter ou mettre en contact avec les yeux, la face ou les organes génitaux. Ne pas faire de nouvelle application avant 7 jours. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux âgés de moins de 8 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème. Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Se laver les mains après l'emploi.

PREMIERS SOINS : PERSONNES

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

PREMIERS SOINS : ANIMAUX DE COMPAGNIE

L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit renferme un pesticide qui est un inhibiteur de la cholinestérase. L'atropine est un antidote.

PRÉCAUTIONS : PERSONNES

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ce produit est nocif s'il est inhalé ou avalé. Éviter d'en respirer la poussière, et en éviter tout contact avec la peau. Porter des gants en caoutchouc pendant l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas utiliser près des aliments.

PRÉCAUTIONS : ANIMAUX DE COMPAGNIE

Des applications répétées peuvent provoquer une irritation cutanée ou nasale chez des animaux sensibles. Dans un tel cas, cesser d'utiliser. Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux. Ne pas utiliser ce produit près des oiseaux, des poissons et des denrées alimentaires. Ne PAS utiliser ce produit sur les chiens ou les chats en même temps que le traitement ou une exposition dans les 30 jours avant ou après ce traitement avec d'autres pesticides, médicaments ou produits chimiques inhibiteurs de la cholinestérase.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Emballer le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))