



NICOSULFURON 75 DF PRÉPARATION POUR LA FABRICATION

POUR LA FABRICATION, LE MÉLANGE, OU LE RÉ EMBALLAGE

N° D'HOMOLOGATION 23654 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE CI-JOINTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES PERSONNES NON AUTORISÉES.

GUARANTIE: Nicosulfuron 75,0%

CONTENU NET : 25-60 kg, 400-600 kg

ATTENTION: PEUT IRRITER LES YEUX

Corteve Agriscience Canada Company

2450, 215 – 2nd Street S.W.

Calgary, Alberta

T2P 1M4

1-800-667-3852

TM Marque de Corteve Agriscience et de ses sociétés affiliées

PRÉCAUTIONS:

- ◆ GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES PERSONNES NON AUTORISÉES.
- ◆ Éviter de respirer la poussière.
- ◆ Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- ◆ Laver les mains et le visage avant de manger, boire, fumer et utiliser les toilettes.
- ◆ Prendre une douche immédiatement après l'usage.
- ◆ Laver les vêtements protecteurs avec de l'eau chaude et un détersif, séparément de la lessive domestique avant de les réutiliser.
- ◆ Ne pas contaminer les nappes d'eau.

PREMIERS SOINS :

INHALATION:

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**SUR LA PEAU
OU VÊTEMENTS :**

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

DANS LES YEUX:

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION:

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Appliquer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI:

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication de pesticides homologués en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

ENTREPOSAGE:

Entreposer le produit dans son contenant d'origine, garder dans un endroit frais, sec et bien ventilé à l'écart des autres pesticides, des engrais, des aliments et des aliments pour animaux. Ne pas utiliser ni entreposer dans une maison ou aux alentours. Tenir loin du feu, d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur. Bien refermer le contenant.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION :

Les fabricants canadiens qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives et les contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour des renseignements détaillés concernant l'élimination ou le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale chargée de la réglementation et le fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR :

2021-2483
2021-10-01

Page 3

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées