

2024-09-06  
2023-5689

**VET-KEM<sup>MD</sup> Siphotrol Forte**

Avec PRECOR<sup>MD</sup> Régulateur de croissance des insectes (RCI)

**SOLUTION**

UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR.

Tue les puces, la tique sanguine et la tique américaine du chien, les cafards, les lépismes argentés, les perce-oreilles et les fourmis dans la maison.

Effet résiduel de 210 jours contre les puces juvéniles

à Double Action

Tue les puces adultes et juvéniles.

Traitement des lieux

Traite une superficie (*ajouter endroit approprié ici qui permettrait d'obtenir 25,4 mL produit/mètre carrés*) (*ajouter équivalent pi<sup>2</sup>*)

**DOMESTIQUE**

PRINCIPE ACTIF:	(S)-Méthoprène	0,01%
	Perméthrine	0,28%

N° D'ENR. 22213 LOI P.A.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

100 mL-1 Litre

WELLMARK INTERNATIONAL  
100 Stone Road West, bureau 111  
Guelph ON N1G 5L3  
1-800-688-7378

## MODE D'EMPLOI

**Renseignements généraux:** Siphotrol Forte élimine les puces adultes et pré-adultes dans la maison. Ce produit contient une combinaison unique de deux ingrédients antiparasitaires, la perméthrine et Precor. La perméthrine tue les puces adultes, tiques brunes et tiques américaines du chien, blattes, lépismes argentés, perce-oreilles et fourmis. Precor, un régulateur de croissance des insectes, interrompt le cycle de vie des puces en empêchant leur développement jusqu'au stade où les adultes deviennent piqueurs pendant 210 jours.

Il atteint les puces dissimulées dans les tapis, moquettes, draperies, meubles capitonnés et litières d'animaux. Siphotrol Forte ne laisse aucune odeur, n'est pas collant et ne tache pas les meubles. L'application régulière de Siphotrol Forte fournira une suppression des puces de longue durée qui réduira le besoin d'administrer un traitement topique aux animaux contre les ectoparasites. Ce produit est conçu pour être utilisé sur moquettes et tapis. Cependant, certaines fibres naturelles (comme la laine) et synthétiques peuvent être affectées par des produits liquides – toujours faire un essai sur une zone peu visible avant l'utilisation. Il faut faire preuve de prudence lors du traitement des surfaces en bois, car des taches d'eau peuvent se former. Les utilisateurs doivent d'abord traiter une petite zone peu apparente pour s'assurer que le produit n'a pas d'effet nocif, comme celui de causer l'apparition de taches ou une décoloration. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation. Une bouteille de *(ajouter le contenu net de l'emballage en mL ou en L)* traitera une surface d'environ *(ajouter endroit approprié ici qui permettrait d'obtenir 25,4 mL produit/mètre carrés)* mètres carrés *(ajouter équivalent pi<sup>2</sup>)* ce qui représente environ 25,4 mL de produit/mètre carré (2,4 mL produit/pi<sup>2</sup>).

**Restrictions:** UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents sur les lieux. NE PAS laisser des personnes ou des animaux pénétrer dans la zone traitée tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, ou des sources d'électricité. Faire sortir les animaux de compagnie et les oiseaux, et recouvrir ou enlever les aquariums. NE PAS utiliser ce produit sur les meubles, les matelas, les draps, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer dans des endroits clos ou surélevés (par exemple, greniers, vides sanitaires, etc.). Aérer les zones traitées après l'application en ouvrant les portes et les fenêtres ou en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.

NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé. Seuls le traitement localisé des fissures et des crevasses et le traitement de périmètre sont autorisés à l'intérieur. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m<sup>2</sup>. Les zones des traitements localisés ne doivent pas se toucher et la surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie traitée de la pièce. Un traitement de périmètre consiste en l'application d'un produit à l'intérieur en bande étroite (d'une largeur de moins de 0,3 mètre) le long du périmètre d'une pièce sur les plinthes, les jonctions murs-plancher ou murs-plafond et les cadrages des portes et des fenêtres.

**Instructions d'application pour lutter contre les puces et les tiques:** Pour lutter efficacement contre les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tous les endroits utilisés par l'animal. Nettoyer les zones touchées, notamment en passant l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et en lavant la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. NE PAS TRAITER LES ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC CE PRODUIT. Traiter les animaux domestiques uniquement avec des produits spécialement homologués pour ce type d'animaux.

Étape 1 – Préparation de la zone à traiter: Avant le traitement, passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Pour lutter efficacement contre les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tous les endroits utilisés par l'animal. Nettoyer les zones touchées, notamment en passant l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et en lavant la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins.

Étape 2 – Pulvérisation de la zone à traiter: BIEN AGITER AVANT L'USAGE. Utiliser uniquement ce produit comme traitement localisé ou traitement de périmètre à l'intérieur dans les fissures et les fentes des murs et des planchers, le long et en arrière des plinthes, sur les cadrages des portes et des fenêtres, et des zones localisées du plancher et des revêtements de sol (p. ex., tapis, moquettes). La literie des animaux peut être traitée avec ce produit ou on peut la remplacer par une litière propre et fraîche après le traitement des autres endroits indiqués. Lors de l'application de ce produit à ces endroits, régler le gicleur de manière à obtenir une légère pulvérisation et utiliser un mouvement de balayage pour appliquer un jet léger et uniforme. Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l'organisme nuisible ciblé, dans la mesure du possible. Si les problèmes de parasites persistent, une deuxième application peut s'avérer nécessaire 2-3 semaines après le traitement initial. Les traitements ne doivent être répétés qu'après 2 semaines/14 jours si le problème persiste ou réapparaît.

**Mode d'emploi pour tuer les cafards, les tiques, les lépismes argentés, les perce-oreilles et les fourmis:** Utiliser uniquement ce produit comme traitement localisé ou traitement de périmètre à l'intérieur dans les fissures et les fentes des murs et des planchers, le long et en arrière des plinthes, sur les cadrages des portes et des fenêtres, sur les rideaux et des zones localisées du plancher et des revêtements de sol (p. ex., tapis, moquettes). Lors de l'application de ce produit à ces endroits, régler le gicleur de manière à obtenir une légère pulvérisation et utiliser un mouvement de balayage pour appliquer un jet léger et uniforme. Appliquer directement sur les parasites si possible. Dans la zone

d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l'organisme nuisible ciblé, dans la mesure du possible. Si les problèmes de parasites persistent, une deuxième application peut s'avérer nécessaire 2-3 semaines après le traitement initial. Les traitements ne doivent être répétés qu'après 2 semaines/14 jours si le problème persiste ou réapparaît. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation.

#### **MISES EN GARDE**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Après usage, bien se laver les mains. Ne pas permettre aux enfants ni aux animaux de marcher sur les surfaces traitées avant qu'elles ne soient complètement sèches. Ne pas utiliser sur les plantes, ou dans les endroits où sont gardés les aliments du bétail. Bien laver toutes les surfaces qui pourraient toucher à la nourriture avant de réutiliser. Ce produit contient un distillat de pétrole qui peut être modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Évitez toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

#### **PREMIERS SOINS**

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux:** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion:** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

#### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes.

#### **ENTREPOSAGE - ÉLIMINATION**

Entreposer dans le contenant original, loin des enfants. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Protéger contre le gel et les hautes températures. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale/territoriale ou municipale.

Renseignements: 1-800-688-7378

Vet-Kem et Siphotrol sont des marques déposées de Wellmark International.