

## PRÉCAUTIONS

### GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Éviter le contact avec les yeux. Employer une ventilation adéquate et éviter de respirer la poussière. Porter un masque approprié pour la poussière approuvé par NIOSH/MSHA en manipulant. Pour l'utilisation sur des grains stockés ou en utilisant un ventilateur de poussière, porter un appareil respiratoire à adduction d'air pur approuvé par NIOSH/MSHA activé sous la pression exigée ou sous autre pression pendant le mélange, le chargement et l'application. Lavez les surfaces de contact alimentaire, et rincez avec de l'eau potable avant de les réutiliser. Ne pas utiliser d'une manière générale l'espace de pulvérisation. Se laver les mains après utilisation. Le personnel non protégés ne doivent pas pénétrer dans la zone en cours d'application ou de nettoyage.

## PRÉCAUTION

Ce produit s'est avéré pour affecter le poids d'essai et la fluidité du grain (voir le tableau ci-dessous). Il est de la responsabilité du propriétaire du grain d'assurer que l'application d'Insecto ne dégradera pas le grain à cause de la perte de poids d'essai. La perte moyenne de poids d'essai pour le blé de printemps rouge (5% d'impureté) à des taux d'application de 0,1 kilogramme et de 0,5 kg/tonne (100 et 500 ppm).

Produit	100ppm	500ppm
Blé De Printemps Rouge CW	1,8kg/ht	6,1kg/ht

Selon des règlements d'évaluation de grain la détection visuelle d'Insecto sur le grain causera le grain d'être en baisse évalué pour prélever (matériel étranger adhérent par compte). Dans des circonstances normales, Insecto n'est pas évident sur le grain aux concentrations jusqu'à 400ppm.

## LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS RECOMMANDE QUE LES GRAINS NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 100PPM INSECTO.

Les Grains contenant au-dessus de 100ppm de la peuvent être dilués par mélange avec des grains non traités. Si ce produit antiparasitaire doit être utilisé sur une denrée, elle ne doit pas être exportée vers les États-Unis et vous désirez des informations sur les niveaux de résidus acceptables aux États-Unis, CropLife Canada visiter le site Web: [www.croplife.ca](http://www.croplife.ca)

**PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour des conseils de traitement. Avez-vous siroté un verre d'eau si possible à avaler. Ne pas provoquer le vomissement à moins que dit de le faire par un centre antipoison ou un médecin. Ne pas donner quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Si sur la peau ou les vêtements: Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement. En cas d'inhalation: Amener la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appelez le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour plus des conseils de traitement.

Si dans les yeux: Tenir les yeux ouverts et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement. Prendre contenant, l'étiquette ou le nom du produit et les produits antiparasitaires numéro d'enregistrement avec vous lors de la recherche médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrer un traitement symptomatique.

## AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

# INSECTO

## POUR LA SUPPRESSION DES INSECTES DE GRAIN

Poudre insecticide prête à utiliser

## COMMERCE – AGRICOLE

Pour la lutte antiparasitaire dans le grain stocké et les entrepôts

### GARANTIE:

Dioxyde de silicium (présent en tant que terre diatomée de 100%) 90.0%

Attention, contient les allergènes du lait.

No. D'HOMOLOGATION: 22489

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARDER HORS LA DE PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Fabriqué par:

NATURAL INSECTO PRODUCTS, INC.

221 Sherwood Place

PO Box 12138

Costa Mesa, CA 92627 U.S.A.

[www.insecto.com](http://www.insecto.com)

800-332-2002

CONTENU NET: 11,34Kg

Les INSECTES MEURENT DE LA DÉSHYDRATATION INSECTO est dérivé de la terre diatomée raffinée selon certaines caractéristiques. Des insectes en

contact avec INSECTO sont lacérés par les particules microscopiques et perdent leurs liquides, (déshydratation) ce qui causera leur décès.

### MODE D'EMPLOI:

INSECTO est prévu pour l'application avec la main ou le chiffon de puissance, ou d'autres moyens appropriés, pour protéger les secteurs et endroits où se trouvent les insectes. Pour appliquer INSECTO dans des fissures et des crevasses, utilisez le chiffon à bulbe ou tout autre équipement approprié.

INSECTO est un insecticide efficace pour tuer des insectes tels que le cucujide roux, des charançons de riz, des charançons de grenier, des alucites de grains, des pyrales méditerranéenne de la farine, des pyrales indiennes de la farine, tribolium rouges de la farine dans les casiers, les wagons couverts, les bateaux et les silos vides de grain. Son utilisation facilitera la protection des semences, de la graine, des grains stockés, du blé, de l'orge, du sarrasin, du maïs, de l'avoine, du riz, du lin textile, du pois, du soja, et du sorgho (milo), INSECTO devrait être épusseté légèrement, approximativement 500g/100m<sup>2</sup> sur tous les murs intérieurs des zones de stockage vides. Dans la mesure du possible, une particulière attention devrait être donnée aux fissures de saupoudrage, aux crevasses et à d'autres secteurs où les insectes se cachent ou rampent. Après avoir épusseté, il n'y a aucun besoin d'enlever la poussière ou d'aérer les secteurs. Il est sûr d'entrer dans le secteur et il peut sans risque être rempli de grain. On recommande que le secteur soit laissé calme pendant deux à trois jours pour éliminer des infestations existantes avant de remplir. Il est souhaitable d'épusseter chaque fois que la zone de stockage est vidée. Pour supprimer les étapes accessibles par la pyrale indienne de la farine et de l'alucite des grains, appliquer à la surface remplie de grain un taux de 500g/100m<sup>2</sup>. Appliquer à intervalles mensuels avec l'apparition des mites et continuer jusqu'à début automne. Dans des infestations graves casser vers le haut la sangle avec un râteau avant le saupoudrage et faites la deuxième demande dans un délai de deux semaines. **Traitement de grain stocké:** Appliquer INSECTO sur les grains au moment de l'entreposage, selon le taux indiqué au tableau ci-dessous. Pour la protéger contre de nouveaux dommages traiter les semences de céréales et immédiatement après la récolte.

Denrée	Quantité de INSECTO par tonne métrique (g/tonne)	
	Cucujide roux	Autres insectes répertoriés
Blé	100	500
Orge	150	500
Avoine, Sarrasin, Seigle, Lin, Soya, Pois, Riz	500	500
Céréales fourragères, graines, maïs, sorgho	1000	1000

**POUR LA PROTECTION EN TRANSIT:** Nettoyer et épusseter les lits de camion, les wagons couverts, et les prises de bateau avant le chargement. Traiter complètement les murs et les planchers et la poussière légèrement après que le récipient soit chargé.

**SUPPRESSION DES PARASITES AUTOUR DE LA MAISON (À L'INTÉRIEUR):** Enduire légèrement le secteur (500g/100m<sup>2</sup>) infesté avec des fourmis, des cancrelats, des poissons argentés, et des mites. Les secteurs communs où les insectes rampent et se cachent sont: Fissures et crevasses, dessous des appareils de construction, autour des pipes et des drains, des boîtes électriques, des bidons d'ordures, des greniers, et des sous-sols.

### ENTREPOSAGE ET ELIMINATION:

**Ne souillez pas l'eau, les aliments pour les humains ou les animaux par entreposage ou par élimination.** Entreposer dans un endroit sec et frais.

### ÉLIMINATION:

- Vider complètement le contenu du récipient dans le dispositif d'application.
- Rendre le contenant inutilisable.
- Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
- Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

2014-07-14

2013-4159