

2016-7138
2016-12-20

(FRONT OF IFC)

ACARICIDE

PREVENTIC®
POUR CHIENS

Pour des encolures mesurant jusqu'à 62 cm
COLLIER ANTITIQUES POUR CHIENS

GARANTIE POUR USAGE DOMESTIQUE:

Amitraze: bis N,N-(dimethyl-2,4 phenyliminométhyl) N-méthylamine9,0%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

MISE EN GARDE : PEUT CONTENIR DE L'HUILE DE DE SOYA

LIRE L'ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE AVANT L'USAGE.

NUM. D'HOM. 24496
LPA

Fabriqué en France pour : (Virbac Logo)
Virbac AH, Inc. ▪ 3200 Meacham Blvd.
Fort Worth, Texas 76137 É-U ▪ 1-800-338-3659

CONTENU NET 27.5 G

Collier antitiques pour chiens

Réglable – s'ajuste à des encolures mesurant jusqu'à 62 cm.

PRÉCAUTIONS: PERSONNES: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS LAISSER LES ENFANTS MANIPULER CE COLLIER. De la poussière se dépose sur le collier pendant l'entreposage. La poussière peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer la poussière du collier. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau

ANIMAUX DE COMPAGNIE : NE PAS UTILISER SUR DES CHATS. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture. La poussière peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Mâcher ou avaler le collier peut être nocif. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien. Éviter de laisser l'animal inhaler la poussière du collier. Retirer le collier en cas d'effets secondaires ou d'irritation cutanée, et shampooiner le chien complètement pour éliminer tout résidu.

Le risque de briser le collier ou de l'ingérer est présent lorsque les chiens jouent sans surveillance et se mordent mutuellement dans la région du cou. Dans l'éventualité où un chien n'a plus son collier, le

2016-7138

2016-12-20

chercher et le récupérer en entier. Des sensibilités peuvent se développer après tout traitement avec des pesticides pour les animaux de compagnie. Des effets indésirables peuvent apparaître surtout chez les plus petits animaux. Surveiller de près. Ne pas utiliser chez les animaux allaités ou âgés de moins de 12 semaines.

PREMIERS SOINS : Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.

PERSONNES : SI LE COLLIER EST AVALÉ OU MÂCHÉ, obtenir de l'aide médicale ou appeler immédiatement un centre antipoison. S'IL Y A CONTACT INVOLONTAIRE AVEC LA PEAU, laver les endroits touchés avec du savon et de l'eau. SI LA POUSSIÈRE DU COLLIER EST INHALÉE, consulter un médecin.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Si le produit a été mâché ou avalé, consulter un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : En cas d'ingestion du collier Preventic[®] par un chien, l'antidote est la Yohimbine à raison de 0,1 mg/kg par voie intraveineuse. Répéter selon les besoins.

MODE D'ACTION ET MODE D'EMPLOI :

DÉTACHE LES TIQUES, INHIBE LEUR ALIMENTATION, ET TUE LES TIQUES AMERICAINES DU CHIEN ET LES TIQUES BRUNES DU CHIEN (TIQUES SANGUINE). NE PAS METTRE PLUS D'UN COLLIER PAR CHIEN.

Remplacer le collier au plus une fois à tous les 90 jours. Consulter un vétérinaire si l'infestation d'organismes nuisibles persiste chez l'animal. .

Placer le collier Preventic[®] autour du cou de chien, l'attacher et l'ajuster suffisamment serré et de manière sécuritaire, de sorte que le chien ne puisse le retirer. Toutefois, l'ajustement doit aussi être assez lâche pour permettre de passer deux doigts entre le collier et le cou du chien. Si le collier est trop serré, il peut occasionner une irritation du cou. Couper et mettre au rebut l'excès de collier; ne pas laisser des chiens ou des enfants jouer avec l'excès de collier. L'activité antitiques débute dans les 24 heures et dure jusqu'à 90 jours. Les tiques présentes dans l'environnement peuvent réapparaître sur le chien, mais elles seront incapables de se nourrir et seront tuées par l'action du collier. Remplacer le collier quand l'efficacité diminue. Enlever le collier avant chaque bain du chien. Le collier antitiques PREVENTIC[®] n'a pas d'effet contre les puces. Pour cette raison, d'autres moyens doivent être utilisés pour le contrôle des puces. Pour une élimination efficace des tiques, le traitement de l'animal devrait être combiné à la désinfection de tous les lieux auxquels celui-ci a accès. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage). Laver le coussin et la literie de l'animal, de même que les pièces où il vit et les endroits environnants. Si le problème de tiques persiste, un traitement insecticide des lieux peut s'avérer nécessaire.

Ne PAS retirer le collier de son emballage jusqu'à ce qu'il soit prêt pour emploi. Enlever alors le collier de son emballage, le dérouler et l'étirer pour activer les matières actives pesticides. Lorsque le collier est porté la première fois, examiner la région du cou de l'animal au moins une

2016-7138

2016-12-20

fois à quelques jours d'intervalle pour vérifier s'il y a de l'irritation ou de seffets nocifs. Ne PAS utiliser sur les chiens âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités avec un autre pesticide.

Ne PAS utiliser ce produit sur des chiens ou des chats simultanément traités ou exposés à d'autres pesticides ou produits chimiques, ou dans les 30 jours avant ou après ce traitement (ou cette exposition).

CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGEPOUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ENTREPOSAGE : Garder dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Ne réutiliser ni le sachet d'emballage vide, ni le boit, ni le collier. Les enveloper dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.