

**Advantage™ 55 Flea and Lice Adulticide**  
**Insert (French)**

<Elanco Logo>

Advantage<sup>MC</sup> 55

Adulticide contre les puces et les poux

Pour les chiens âgés de 8 semaines et plus, pesant entre 11 et 25 kg

Traitement topique mensuel contre les puces et les poux

LIQUIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR UTILISATION SUR LES CHIENS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride à 9,1 %

N°. D'HOM. 25127 L.P.A.

Un à six tubes de 2,5 mL

46 **Avantage 55 Adulticide** contre les puces et les poux offre une double protection. Il  
47 contrôlera les puces et les poux présents sur le chien en moins d'un jour après le  
48 traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations durant au  
49 moins 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces  
50 dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après  
51 le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité  
52 continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Le traitement doit être  
53 répété uniquement si les problèmes réapparaissent

54  
55 Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection contre les  
56 puces et les poux; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la  
57 suite d'un shampoing.

58 Pour une élimination efficace des puces et des poux, le traitement de l'animal devrait  
59 être accompagné d'un nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente. Passer l'aspirateur  
60 sur les planchers, tapis et meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où  
61 l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-  
62 être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

63  
64 L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut  
65 provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite  
66 allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec **Avantage 55 Adulticide**  
67 contre les puces et les poux tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de  
68 cette dermatite. **Avantage 55 Adulticide** contre les puces et les poux est sécuritaire  
69 lorsqu'il est utilisé de pair avec les produits vétérinaires d'emploi courant. Consulter  
70 votre vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux sous médication. Pour l'utilisation sur  
71 les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

72  
73 **MISES EN GARDE :**

74  
75 **ÊTRES HUMAINS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré  
76 ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux.  
77 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au  
78 moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se  
79 laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit)  
80 avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas  
81 sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux  
82 animaux en conservant ou en éliminant le produit.

83  
84 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8  
85 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être  
86 trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de TOUT pesticide pour  
87 animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont  
88 plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes  
89 persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

90

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires
---

peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

91

92 **PREMIERS SOINS :**

93

94 **ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières  
95 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le  
96 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer  
97 l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le  
98 traitement.

99 **EN CAS D'INGESTION,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement  
100 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées  
101 si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir  
102 reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche  
103 à une personne inconsciente.

104 **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les  
105 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20  
106 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le  
107 traitement.

108

109 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner  
110 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les  
111 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.  
112 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro  
113 d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

114

115 **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter le patient selon les symptômes.

116

117 **ENTREPOSAGE :** Conserver le contenant à température ambiante.

118

119 **ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le  
120 bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

121

122 **MODE D'EMPLOI :**

123 Ce produit contient imidaclopride. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits  
124 antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent  
125 imidaclopride après avoir utilisé Advantage 55 Adulticide contre les puces et les poux.

- 126 • NE PAS administrer par la gueule. NE PAS utiliser sur d'autres animaux.
- 127 • Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des  
128 femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement  
129 médical ou pesticide.
- 130 • Consulter un vétérinaire si l'infestation persiste.
- 131 • Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes réapparaissent.

- 132 • Ne pas utiliser sur les chiots âgés de moins de 8 semaines.
- 133 • Utiliser uniquement sur les chiens pesant entre 11 et 25 kg.
- 134 • Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage
- 135 contient 1 à 6 doses mensuelles de 2,5 mL. Utiliser sur le chien de la manière
- 136 décrite ci-dessous. Ne pas utiliser une dose supérieure à un tube de 2,5 mL à la
- 137 fois.
- 138 • Retirer un applicateur de l'emballage.
- 139 • Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut. Retirer le
- 140 bouchon du tube.
- 141 • Retourner le bouchon et le placer en position inversée au bout du tube.
- 142 • Tourner le bouchon afin de briser le sceau du tube, puis retirer le bouchon du
- 143 tube.
- 144 • Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Le contenu entier du tube
- 145 d'Avantage 55 Adulticide contre les puces et les poux devrait être appliqué de
- 146 façon égale, en quatre à cinq points sur le dessus du dos, en partant des
- 147 omoplates jusqu'à la base de la queue. À chaque point, écarter le pelage du dos
- 148 du chien jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau
- 149 et le presser de façon à y appliquer une portion de solution. Ne pas appliquer
- 150 une quantité excessive de solution en un endroit ce qui pourrait lui permettre de
- 151 couler sur les côtés du chien.
- 152 • Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal.
- 153 • Tenez votre animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à
- 154 ce qu'Avantage 55 Adulticide contre les puces et les poux sèche.
- 155 • Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

156  
157 GARDER LE FEUILLET D'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

158  
159 Elanco Canada Limited  
160 1919 Minnesota Court, Suite 401  
161 Mississauga, Ontario L5N 0C9

162  
163 Advantage, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou  
164 de ses sociétés affiliées. ©2022 Elanco ou ses sociétés affiliées.

165

**Advantage™ 55 Flea and Lice Adulicide**  
**Carton (French)**

<Elanco Logo>

Advantage<sup>MC</sup> 55

Adulicide contre les puces et les poux

Pour les chiens âgés de 8 semaines et plus, pesant entre 11 et 25 kg

Traitement topique mensuel contre les puces et les poux

LIQUIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR UTILISATION SUR LES CHIENS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride à 9,1 %

N°. D'HOM. 25127 L.P.A.

Un à six tubes de 2,5 mL

Elanco Canada Limited  
1919 Minnesota Court, Suite 401  
Mississauga, Ontario L5N 0C9  
1-800-265-5475

208 **Avantage 55 Adulticide** contre les puces et les poux offre une double protection. Il  
209 contrôlera les puces et les poux présents sur le chien en moins d'un jour après le  
210 traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations durant au  
211 moins 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces  
212 dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après  
213 le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité  
214 continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Le traitement doit être  
215 répété uniquement si les problèmes réapparaissent.

216  
217 Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection contre les  
218 puces et les poux; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la  
219 suite d'un shampoing.

220 Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

221

#### 222 MISES EN GARDE :

223

224 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré  
225 ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux.  
226 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au  
227 moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se  
228 laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit)  
229 avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas  
230 sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux  
231 animaux en conservant ou en éliminant le produit.

232

233 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8  
234 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être  
235 trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de **TOUT** pesticide pour  
236 animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont  
237 plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes  
238 persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

239

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.
--

240

#### 241 PREMIERS SOINS :

242

243 **ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières  
244 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le  
245 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer  
246 l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le  
247 traitement.

248 EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement  
249 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées  
250 si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir  
251 reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche  
252 à une personne inconsciente.

253 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les  
254 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20  
255 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le  
256 traitement.

257  
258 ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner  
259 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les  
260 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.  
261 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro  
262 d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

263  
264 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

265  
266 ENTREPOSAGE : Conserver le contenant à température ambiante.

267  
268 ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le  
269 bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

270  
271

272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299

**Advantage™ 55 Flea and Lice Adulticide**  
**Tube (French)**

<Elanco Logo>

Advantage<sup>MC</sup> 55

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

PRINCIPE ACTIF : IMIDACLOPRIDE à 9,1 %

N°. D'HOM. 25127 L.P.A.

Elanco Canada Limited  
1919 Minnesota Court, Suite 401  
Mississauga, Ontario L5N 0C9

2,5 mL