

2014-1141  
2014-04-09

GROUPE	3	INSECTICIDE
--------	---	-------------

DOKTOR DOOM  
INSECTICIDE FUMIGANT À ACTION TOTALE  
INSECTICIDE FUMIGANT SOUS PRESSION  
COMMERCIAL

FIXER LA VALVE DANS LA POSITION OUVERTE POUR UNE VAPORISATION  
CONTINUE OU VAPORISER PENDANT UNE DURÉE DE 15 À 20 SECONDES  
POUR CHAQUE 300 MÈTRES CUBE

UNE APPLICATION TUE LES TIQUES, LES PUCES, LES BLATTES, LES  
FOURMIS, LES ARAIGNÉES, LES MOUSTIQUES ET LES MOUCHES VISIBLES À  
TOUT STADE DE CROISSANCE.

GARANTIE :

Pyréthrine..... 0,4 %  
Butoxyde de pipéronyle ..... 2,0 %

N° D'HOMOLOGATION 25428  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 150 GRAMMES

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE      EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

753146 AB Ltd. o/a UltraSol Industries  
10755-69, Avenue  
Edmonton (Alberta)  
T6H 2C9

(780) 432-6535

### **MODE D'EMPLOI POUR USAGE À L'INTÉRIEUR :**

Éloigner les animaux domestiques, les oiseaux et les aquariums. Ouvrir les armoires et les portes de l'aire de traitement. Couper l'alimentation des ventilateurs et des climatiseurs. Éteindre toutes les flammes et les veilleuses. Fermer les portes et les fenêtres. Orienter l'ouverture de la valve loin du visage et des yeux lorsqu'elle est actionnée. Une bonbonne suffit pour chaque 300 mètres cube d'espace dégagé.

### **OPÉRATION DE LA VALVE :**

La valve peut être actionnée manuellement ou fixée en position ouverte. Pour fixer la valve en position ouverte afin d'effectuer une vaporisation continue, enfoncer fermement le levier de la valve vers le bas, jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée et demeure enfoncée. Pour de meilleurs résultats, vaporiser manuellement les pièces éloignées, en dirigeant le jet vers le plafond; 4 à 6 secondes suffisent amplement pour une pièce moyenne (3 m × 3 m × 3 m). Vaporiser aussi les fissures et les crevasses. Placer d'abord le vaporisateur d'insecticide sur un support ou une table au milieu de la pièce dégagée de 300 mètres cube, puis fixer la valve en position ouverte. Quitter immédiatement les lieux et garder la pièce fermée pour une période de 2 heures avant d'aérer. Ouvrir toutes les portes et les fenêtres et ventiler pendant 30 minutes. Au besoin, répéter l'opération 2 semaines plus tard. Cette préparation tue les insectes visibles seulement, et n'a pas d'effet résiduel.

**ATTENTION :** Ne pas utiliser le vaporisateur d'insecticide dans les logements, les installations d'entreposage ou de manipulation des aliments, ou dans les entreprises de service lorsque la valve est fixée en position ouverte.

### **PRÉCAUTIONS :**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Contenu sous pression. Le contenant peut exploser s'il est exposé à la lumière du soleil ou à une autre source de chaleur pendant une période prolongée. Ne pas jeter le contenant dans le feu ou dans un incinérateur, et ne pas l'entreposer à des températures dépassant 50 °C. Ne pas vaporiser sur les murs, le carrelage d'agglomérés ou le plastique. Ne pas vaporiser sur la nourriture à découvert. Éviter de contaminer la nourriture destinée à la consommation humaine ou animale. Ne pas vaporiser dans la flamme nue ou près de celle-ci.

### **PREMIERS SOINS :**

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Traiter selon les symptômes. Contient le distillat de pétrole.

## **RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE:**

Gestion de la résistance, Doktor Doom Insecticide Fumigant À Action Totale, insecticide du groupe 3. Toute population d'insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à Doktor Doom Insecticide Fumigant À Action Totale et à d'autres insecticides du groupe 3. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides:

- Dans la mesure du possible, alterner Doktor Doom Insecticide Fumigant À Action Totale ou les insecticides du même groupe 3 avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des insecticides ou acaricides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les insecticides ou acaricides dans le cadre d'un programme de lutte intégré comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations d'insectes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la Lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à UltraSol Industries au (780) 432-6535.

## **AVIS À L'UTILISATEUR :**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

## **ÉLIMINATION :**

Lorsque le contenant est vide, appuyer d'abord sur la valve pour éliminer la pression, puis jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provinciale. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )