

Advantage™ 9 Flea Adulticide
Insert (French)

<Elanco Logo>

Advantage^{MC} 9

Adulticide contre les puces

Pour les chats âgés de 8 semaines et plus, pesant 4 kg et moins.

Traitement topique mensuel contre les puces

LIQUIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

POUR UTILISATION SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride 9,1 %

N°. D'HOM. 25128 L.P.A.

Un à Six tubes de 0,4 mL

42

43 **Avantage 9 Adulticide** contre les puces contrôlera les puces présentes sur le chat en
44 moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les
45 nouvelles infestations jusqu'à 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition
46 de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6
47 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour
48 assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Le
49 traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

50

51 Donner un shampoing au chat peut diminuer la durée de la protection contre les
52 puces; par conséquent, une nouvelle application est recommandée à la suite d'un
53 shampoing. Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait
54 être combiné à la désinfection de tous les endroits fréquentés par l'animal. Il est
55 nécessaire de passer l'aspirateur sur les planchers, tapis et meubles (jeter le sac après
56 usage) et de laver les endroits où l'animal se couche, vit ainsi que les lieux voisins. Si le
57 problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des
58 lieux.

59

60 Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le médecin
61 vétérinaire. L'alimentation répétitive des puces sur les animaux de compagnie peut
62 amener un trouble d'hypersensibilité dermique : la dermatite allergique aux piqûres de
63 puces (DAPP). Le traitement des animaux avec **Avantage 9 Adulticide** contre les
64 puces tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette condition.
65 **Avantage 9 Adulticide** contre les puces est sécuritaire lorsqu'il est utilisé de pair avec
66 les produits vétérinaires d'emploi courant. Consulter votre vétérinaire avant d'utiliser sur
67 des animaux sous médication.

68

69 **MISES EN GARDE :**

70

71 **ÊTRES HUMAINS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré
72 ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux.
73 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au
74 moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se
75 laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit)
76 avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas
77 sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux
78 animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

79

80 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8
81 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être
82 trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de **TOUT** pesticide pour
83 animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont
84 plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

85

Effets secondaires :

Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

86

87 **PREMIERS SOINS :**

88

89 **ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières
90 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le
91 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
92 l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
93 traitement

94

95 **EN CAS D'INGESTION,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement
96 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées
97 si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir
98 reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien
99 administrer par la bouche à une personne inconsciente.

100

101 **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les
102 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20
103 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
104 traitement.

105

106 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner
107 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les
108 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.
109 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
110 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

111

112 **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter le patient selon les symptômes.

113

114 **ENTREPOSAGE :** Entreposer le contenant à la température de la pièce.

115

116 **ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le
117 bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

118

119 **MODE D'EMPLOI :**

- 120 Ce produit contient imidaclopride. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits
121 antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent
122 imidaclopride après avoir utilisé Advantage 9 Adulticide.
- 123 • Ne PAS administrer par la gueule. Ne PAS utiliser sur d'autres animaux. Consulter
124 un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides
125 ou qui allaitent, ou des animaux sous médication ou traités avec d'autres pesticides.
126 Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un
127 problème.
 - 128 • Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.
 - 129 • Ne pas utiliser sur les chats âgés de moins de 8 semaines.
 - 130 • Utiliser uniquement sur les chats pesant 4 kg et moins.
 - 131 • Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage contient
132 1 à 6 doses mensuelles de 0,4 mL. Utiliser sur le chat selon la manière décrite ci-
133 dessous. Ne pas utiliser une dose supérieure à un tube de 0,4 mL à la fois.
 - 134 • Retirer un applicateur de l'emballage.
 - 135 • Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut. Retirer le bouchon du
136 tube.
 - 137 • Retourner le bouchon et le placer en position inversée au bout du tube.
 - 138 • Tourner le bouchon afin de briser le sceau du tube, puis retirer le bouchon du tube.
 - 139 • Écarter le pelage dans la région du cou, à la base du crâne, jusqu'à ce que la peau
140 soit visible.
 - 141 • Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider
142 complètement et directement sur la peau exposée. Éviter tout contact de ce produit
143 avec les yeux ou la gueule de l'animal. Le produit a un goût amer; par conséquent, si
144 le chat le lèche immédiatement après le traitement, il est possible qu'il salive durant
145 un court moment. L'application du produit à la base du crâne réduira les risques de
146 léchage.
 - 147 • Tenez votre animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce
148 qu'Advantage 9 Adulticide contre les puces sèche.
 - 149 • Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

150

151 GARDER L'INFORMATION DE L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

152

153 Elanco Canada Limited
154 1919 Minnesota Court, Suite 401
155 Mississauga, Ontario L5N 0C9

156

157 Advantage, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou
158 de ses sociétés affiliées. ©2022 Elanco ou ses sociétés affiliées.

159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Advantage™ 9 Flea Adulticide
Carton (French)

<Elanco Logo>

Advantage^{MC} 9

Adulticide contre les puces

Pour les chats âgés de 8 semaines et plus, pesant 4 kg et moins

Traitement topique mensuel contre les puces

LIQUIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

POUR UTILISATION SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride 9,1 %

N°. D'HOMOLOGATION : 25128 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Un à Six Tubes de 0,4 mL

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9
1-800-265-5475

202 Avantage 9 Adulticide contre les puces contrôlera les puces présentes sur le chat en
203 moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les
204 nouvelles infestations jusqu'à 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition
205 de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6
206 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour
207 assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation. Le
208 traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

209

210 Donner un shampoing au chat peut diminuer la durée de la protection contre les
211 puces; par conséquent, une nouvelle application est recommandée à la suite d'un
212 shampoing.

213 Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le médecin
214 vétérinaire.

215

216 **MISES EN GARDE :**

217

218 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré
219 ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux.
220 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au
221 moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se
222 laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit)
223 avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas
224 sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux
225 animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

226

227 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8
228 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être
229 trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour
230 animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont
231 plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière. Si
232 les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

233

<p>Effets secondaires : Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.</p>
--

234

235

236

237 **PREMIERS SOINS :**

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

2022-0231
2022-01-31

268
269
270
271
272
273
274
275
276

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Advantage™ 9 Flea Adulticide
Tube (French)

<Elanco Logo>

Advantage^{MC} 9

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride 9,1 %

N°. D'HOM. 25128 L.P.A.

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9
0,4 mL