

2021-0663
2021-03-22

Insecticide Pour La Maison Contre Les Puces & Les Tiques VET-KEM^{MD} Siphotrol^{MD} 1000

Avec PRECOR^{MD} (RCI) Régulateur de croissance des insectes

UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR.

Tue les puces, la tique sanguine et la tique américaine du chien dans la maison.

Action rémanente de 7 mois contre les puces au stade pré-adulte

Traitement pour locaux à double action

Tue les puces aux stades adulte et pré-adulte (larves)

Traite une surface de 93 m² (1 000 pi²)

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF:

(S)-Méthoprène ... 0,078%

Perméthrine ... 0,80%

N° D'HOMOL. 25739 LOI P.A.

Avertissement, contient l'allergène soya.

ATTENTION

IRRITANT CUTANÉ

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

EXPLOSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Contenu Net 227 g

Wellmark International 5420

100 Stone Road West, bureau 111,

Guelph ON N1G 5L3

1-800-688-7378

2021-0663

2021-03-22

MODE D'EMPLOI

Renseignements Généraux: L'insecticide Pour La Maison Contre Les Puces & Les Tiques VET-KEM Siphotrol 1000 tue les puces aux stades adulte et pré-adulte (larves) et les tiques dans la maison. L'insecticide Pour La Maison Contre Les Puces & Les Tiques VET-KEM Siphotrol 1000 contient une combinaison unique de deux ingrédients antiparasitaires, la perméthrine et Precor. La perméthrine, elle tue les puces au stade adulte, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien. Precor, un régulateur de la croissance des insectes, interrompt le cycle de vie des puces en empêchant leur développement jusqu'au stade où les adultes deviennent piqueurs pendant 7 mois.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur moquettes et tapis. Cependant, certaines fibres naturelles (comme la laine) et synthétiques peuvent être affectées par des produits liquides – toujours faire un essai sur une zone peu visible avant l'utilisation. Il faut faire preuve de prudence lors du traitement des surfaces en bois, car des taches d'eau peuvent se former. Les utilisateurs doivent d'abord traiter une petite zone peu apparente pour s'assurer que le produit n'a pas d'effet nocif, comme celui de causer l'apparition de taches ou une décoloration. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation. Un contenant traitera une surface de 93 m² (1000 pi²).

Restrictions: UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents sur les lieux. NE PAS laisser des personnes ou des animaux pénétrer dans la zone traitée tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, ou des sources d'électricité. Faire sortir les animaux de compagnie et les oiseaux, et recouvrir ou enlever les aquariums. NE PAS utiliser ce produit sur les meubles, les matelas, les draps, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer dans des endroits clos ou surélevés (par exemple, greniers, vides sanitaires, etc.). Aérer les zones traitées après l'application en ouvrant les portes et les fenêtres ou en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.

NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé. Seuls le traitement localisé des fissures et des crevasses et le traitement de périmètre sont autorisés à l'intérieur. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les zones des traitements localisés ne doivent pas se toucher et la surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie traitée de la pièce. Un traitement de périmètre consiste en l'application d'un produit à l'intérieur en bande étroite (d'une largeur de moins de 0,3 mètre) le long du périmètre d'une pièce sur les plinthes, les jonctions murs-plancher ou murs-plafond et les cadrages des portes et des fenêtres.

Instructions d'application pour lutter contre les puces et les tiques: Pour lutter efficacement contre les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tous les endroits utilisés par l'animal. Nettoyer les zones touchées, notamment en passant l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et en lavant la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. NE PAS TRAITER LES ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC CE PRODUIT. Traiter les animaux domestiques uniquement avec des produits spécialement homologués pour ce type d'animaux.

Étape 1 – Préparation de la zone à traiter: Avant le traitement, passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Pour lutter efficacement contre les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tous les endroits utilisés par l'animal. Nettoyer les zones touchées, notamment en passant l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et en lavant la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins.

2021-0663

2021-03-22

Étape 2 – Pulvérisation de la zone à traiter: BIEN AGITER AVANT L'USAGE. Utiliser uniquement ce produit comme traitement localisé ou traitement de périmètre à l'intérieur dans les fissures et les fentes des murs et des planchers, le long et en arrière des plinthes, sur les cadrages des portes et des fenêtres, et des zones localisées du plancher et des revêtements de sol (p. ex., tapis, moquettes). La literie des animaux peut être traitée avec ce produit ou on peut la remplacer par une litière propre et fraîche après le traitement des autres endroits indiqués. Lors de l'application de ce produit à ces endroits, (pointer vers le bas à 90 cm de la surface à traiter) et utiliser un mouvement de balayage pour appliquer un jet léger et uniforme. Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l'organisme nuisible ciblé, dans la mesure du possible. Si les problèmes de parasites persistent, une deuxième application peut s'avérer nécessaire 2-3 semaines après le traitement initial. Les traitements ne doivent être répétés qu'après 2 semaines/14 jours si le problème persiste ou réapparaît.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation ou une sensibilisation de la peau. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Nocif si ingéré, inhalé ou absorbé par la peau. Éviter de respirer la brumisation. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après utilisation.

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE

Contenu sous pression. Ne pas percer le contenant, l'entreposer près d'une flamme nue ou l'exposer à une température supérieure à 50°C.

ÉLIMINATION

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette pour libérer toute pression résiduelle. Replacer le capuchon, envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Renseignements: 1-800-263-3532

Vet-Kem, Siphotrol et Precor sont des marques déposées de Wellmark International.