

Country Vet® Highly Active Farm & Home Mosquito & Fly Spray COMMERCIAL

AÉROSOL SOUS PRESSION PRÊT À L'EMPLOI

Un insecticide concentré pour usage dans les hôpitaux, les usines de traitement des aliments, les restaurants, les hôtels et les autres édifices commerciaux et industriels, pour éliminer les insectes volants et rampants.

Pour usage dans les laleries et les locaux de traite. À utiliser également sur le bétail laitier et le bétail de boucherie pour éliminer les insectes volants.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARANTIE:

Pyréthrine..... 0,50%
Butoxyde de pipéronyle 3.84%

Voir au Verso pour Lieux d'Utilisation et Mesures de Précautions Recommandées

NO. D'HOMOLOGATION 28001

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER



**EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE**



EXPLOSIF

Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
905-669-9876

NET CONTENTS ____ g

MODE D'EMPLOI : Maintenir la bonbonne à la verticale pour pulvériser.

INSECTES VOLANTS : Mouches, moustiques, guêpes, moucheron et papillons nocturnes. Fermer les portes et les fenêtres. Appliquer pendant 6 à 10 secondes par espace de 30 m³. Diriger l'aérosol vers le haut dans un mouvement de balayage vers toutes les parties de la pièce, en particulier les fenêtres et autres sources de lumière. Diriger aussi directement sur les zones où se trouvent des insectes; il doit y avoir contact entre le produit et les insectes pour les éliminer. Continuer à pulvériser en vous écartant d'au moins 1 m des murs intérieurs, des tissus et des meubles. Garder les portes et les fenêtres fermées pendant 15 minutes après chaque traitement. Après le traitement, aérer adéquatement les zones scellées et enlevez les insectes morts. Pulvériser uniquement lorsque la température est inférieure à 32 degrés C.

INSECTES RAMPANTS : Blattes, araignées, criquets, fourmis, anthrènes des tapis, centipèdes et lépismes argentés. Pulvériser les endroits où ils pourraient se dissimuler, comme les plinthes, les zones humides, les ouvertures autour des évier, des tuyaux et des drains, derrière les zones d'entreposage. Pulvériser les pistes de fourmis, autour des seuils de portes, des cadres de fenêtres ou directement dans les nids de fourmis. Les insectes doivent être touchés par la pulvérisation pour être éliminés.

PUNAISES DE LITS : Pulvériser le matelas, en particulier autour des coutures et du capitonnage. Défaire les lits, pulvériser tous les joints. Répéter au besoin. Pulvériser également les fissures, les lézardes, les plinthes et toute autre cachette possible dans la pièce.

PUCES : Pulvériser les endroits infestés tels que les lits d'animaux et les endroits de repos, près des fissures et des lézardes, le long et derrière les plinthes, les cadres de fenêtres et de portes et les endroits précis sur le plancher et les revêtements de plancher où ces parasites peuvent être présents. Retirer la vieille literie et remplacez-la par une literie propre après le traitement. Il doit y avoir un contact entre le produit et les insectes pour les éliminer. Ne traiter pas les animaux domestiques avec ce produit.

PULVÉRISATION AMBIANTE : Tue les insectes volants dans les locaux de traite et laiteries. Diriger l'aérosol vers le haut dans un mouvement de balayage dans toutes les parties de la pièce, en particulier les fenêtres et autres sources de lumière. Appliquer pendant 6 à 10 secondes par espace de 30 m³. Évacuer tous les animaux de la zone à traiter avant d'utiliser la pulvérisation ambiante. Pour de meilleurs résultats, fermer toutes les portes et fenêtres pendant le traitement et garder la pièce fermée pendant quinze minutes avant la ventilation. Ventiler à fond les zones traitées pendant au moins 50 minutes avant de ramener les animaux. Il doit y avoir un contact entre le produit et les insectes pour les éliminer. Balayer les insectes morts. Répéter au besoin avec une pulvérisation supplémentaire des zones de reproduction. Pulvériser uniquement lorsque la température est inférieure à 32 degrés C.

PULVÉRISATION DU BÉTAIL : Pour traiter le bétail de boucherie et le bétail laitier contre les attaques de mouches domestiques, de mouches d'étable et de frelons, pulvériser quotidiennement les animaux d'une fine brume. Appliquer pendant 6 à 8 secondes par animal. La pulvérisation doit être suffisante pour humecter le bout des poils seulement. Ne mouiller ni le poil ni la peau. Attention de ne pas vaporiser dans les yeux ou la bouche de l'animal. Traiter les vaches laitières au moins 20 minutes avant la traite. Ne pas pulvériser directement sur les pis. Laver les pis avant la traite. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Attention de ne pas contaminer la nourriture ou les auge. Ne pas pulvériser sur le lait ou l'équipement de traite.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas demeurer dans la zone traitée. Après le traitement, aérer adéquatement les zones scellées. Couvrir le lait et l'équipement de traite pour empêcher toute contamination causée par la pulvérisation ou par les insectes morts. (Toute surface traitée qui pourrait entrer en contact avec la nourriture ou les produits d'alimentation doit être lavée à fond à l'eau potable après avoir été vaporisée et avant d'être utilisée). Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Lavez après emploi. **CONTENU SOUS PRESSION** : Ne placer pas dans l'eau chaude ni près d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur. Ne percer pas et n'incinérer pas la bonbonne; ne pas entreposer à des températures supérieures à 50 degrés C. Ne pas pulvériser près ou sur une flamme nue. Dans les hôpitaux, ne pas utiliser dans la pouponnière ni dans les chambres d'enfants, ni dans des endroits où sont confinées des personnes âgées ou malades.

Dans les usines de traitement des aliments et les commerces servant de la nourriture, appliquer uniquement lorsque l'établissement n'est pas en fonction. Sortir tous les aliments avant le traitement. Couvrir toutes les surfaces de traitement des aliments et nettoyer à fond à l'eau potable avant de remettre en marche.

Ne pas utiliser sur des êtres humains. Éviter d'inhaler le contenu de l'aérosol.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si pulvérisé dans les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si avalé accidentellement, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour dégager toute la pression. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.