

2024-02-20
2023-2157

La présente étiquette a été modifiée conformément à les décisions de réévaluation concernant les pyréthrinés RVD2023-06 et butoxyde de pipéronyle RVD2023-07. L'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au le 2 mars 2025, conformément à la période d'abandon graduel établie dans les décisions de réévaluation concernant les pyréthrinés RVD2023-06 et butoxyde de pipéronyle RVD2023-07. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à pmra.info-arla@hc-sc.gc.ca. Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

Ovex
solution à vaporiser pour chiens et chats
avec Régulateur de croissance des insectes (RCI) Precor®

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHATS

Tue les puces du chien, les puces du chat, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien.

NE PAS UTILISER SUR LES CHIOTS OU LES CHATONS ÂGÉS DE MOINS DE 1 SEMAINES

NE PAS UTILISER SUR D'AUTRES ANIMAUX

DOMESTIQUE
SOLUTION

PRINCIPE ACTIF

(S)-Méthoprène 0,10%
Pyréthrines 0,20%
Butoxyde de Pipéronyl (technique) 0,37%
Dicarboximide de N-Octyl bicycloheptène 0,61%

N° D'HOMOLOGATION : 23692 LPA

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION INFLAMMABLE
AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX

Wellmark International
100 Stone Road West, bureau 111
Guelph ON N1G 5L3
1-800-688-7378

Contenu Net: 175-1000 ml

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: Tue les puces adultes du chat et du chien, ainsi que les tiques sanguines et tiques américaines du chien. Interrompt efficacement le cycle vital de la puce et empêche la croissance des stades juvéniles de la puce. Sur les chiens et les chats, un traitement élimine les puces adultes pendant un maximum de 7 jours et empêche les oeufs d'éclore pendant 30 jours.

Limitations d'utilisation

NE PAS utiliser sur les chiots ou les chatons âgés de moins de 12 semaines.

NE PAS UTILISER SUR D'AUTRES ANIMAUX.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent, ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur.

NE PAS administrer par la gueule.

Étant donné l'effet résiduel de Ovex, **NE PAS** utiliser ce produit plus d'une fois par mois. Le traitement peut être répété seulement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Ce produit contient Butoxyde de pipéronyl, Dicarboximide de N-Octyl bicycloheptène, (S)-Méthoprène, et Pyréthrinés. **NE PAS** traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des produits destinés à un traitement topique local, des colliers ou des poudres qui contiennent Butoxyde de pipéronyl, Dicarboximide de N-Octyl bicycloheptène, (S)-Méthoprène ou Pyréthrinés après avoir utilisé OVEX.

MODE D'EMPLOI:

POUR USAGE UNIQUEMENT SUR LES CHIENS ET LES CHATS

Tue les puces du chien, les puces du chat, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien.

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Conserver les renseignements figurant sur l'emballage pour référence future. Mouiller la tête du chien/chat avec de l'eau pour repousser les organismes nuisibles sur le corps. Tenir la canette en position verticale à une distance de 20 cm du chien/chat. Pulvériser tout le corps du chien/chat, en commençant par la tête et en progressant vers la queue. Les tiques sont difficiles à contrôler et doivent être pulvérisées directement. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. **NE PAS** appliquer sur la face, les yeux, le museau, la gueule ou les organes génitaux du chien/chat. En pulvérisant, utiliser les mains pour ébouriffer la fourrure du chien/chat pour permettre au produit pulvérisé de pénétrer jusqu'à la peau. Pulvériser jusqu'à ce que la fourrure soit légèrement humectée – sans être mouillée. Essuyer tout excès de produit du chien/chat avec un linge sec et peigner ou brosser. En employant cette méthode, l'application de 2 à 4 pressions (3 à 6 ml) de la gâchette par kilogramme permettra d'éliminer efficacement les puces. Baigner le chien/chat peut réduire l'efficacité du produit. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement des locaux au moyen d'un insecticide étiqueté à cette fin pourrait être nécessaire. L'utilisation d'un produit efficace pour contrôler les populations adultes et larvaires des puces dans l'environnement de l'animal (tels que Vet Kem Siphotrol^{MD} Forte, Vet Kem

Siphotrol^{MD} 1000 ou Vet Kem Siphotrol^{MD} 2000) réduira la possibilité de réinfestation de l'animal. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal de compagnie par les puces continue à poser un problème. **NE PAS** appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale de compagnie. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale de compagnie, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale de compagnie, ou les laver à fond après le traitement.

MISES EN GARDE:

- Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, idéalement en plein air.
- **NE PAS** laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non ciblées.

PERSONNES: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché. Nocif si ingéré. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche, la peau et les vêtements. Pour appliquer le produit, porter des gants en caoutchouc. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon.

ANIMAUX DE COMPAGNIE:

Nocif si ingéré. Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

PREMIERS SOINS:

PERSONNES: EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas,

appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les produits contenant des pyréthrine peuvent provoquer chez certains chats sensibles une stimulation de la salivation, temporaire et anodine. Le cas échéant, l'utilisation des doses les plus faibles du produit est recommandée. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal de compagnie en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

Effets secondaires :

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1 (800) 688-7378.

Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1 (800) 688-7378.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

L'exposition de la peau peut provoquer des sensations transitoires (picotement, brûlure, démangeaison, engourdissement). Les autres symptômes d'exposition peuvent comprendre des effets respiratoires (comme la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des céphalées ou des étourdissements. Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Garder le contenant dans un endroit frais, loin de toute source de chaleur ou de flammes nues. **NE PAS** entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : **NE PAS** réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

PRECOR et SIPHOTROL sont des marques déposées de Wellmark International.
HOTLINE 1-800-688-7378