

Panneau avant

Hartz® UltraGuard®
Gouttes antipuces et antitiques pour chiens et chiots de plus de 14 kg (30 lb)
SOLUTION

Tue :
les puces et les tiques

PRINCIPE ACTIF :
Perméthrine 45 %

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS



TOXIQUE POUR LES CHATS

N° D'HOMOL. 25922 L.P.A.

CONTENU NET : 3 tubes de 2 mL chacun

HARTZ CANADA, INC.
1125, rue Talbot
St. Thomas (Ontario)
N5P 3W7
1-800-275-1414

2020-5495
2020-12-18

Panneau arrière

MODE D'EMPLOI

Ce produit contient perméthrine. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent perméthrine après avoir utilisé Hartz® UltraGuard® Gouttes antipuces et antitiques pour chiens et chiots de plus de 14 kg (30 lb).

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

1. Sortir un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale.
2. Enlever le capuchon. Renverser le capuchon et le placer sur l'ouverture du tube.
3. Appuyer sur le capuchon pour briser le sceau.
4. Enlever soigneusement le capuchon. Placer le bout du tube sur le dos du chien, entre les omoplates, et appuyer sur le tube pour en extraire la moitié du contenu.
5. Inverser le tube applicateur verticalement et aller à la queue du chien. Placer le bout du tube à la base de la queue et appliquer le reste du contenu du tube sur le haut de la croupe, près de la base de la queue.
6. Répéter chaque mois si le problème de puces ou tiques persiste.

Ne pas utiliser ce produit plus d'une fois toutes les 3 semaines. Répéter le traitement chaque mois pour assurer un contrôle antiparasitaire continu dans les situations de risque permanent d'infestation. Ne pas utiliser sur les animaux âgés de moins de 12 semaines. Cesser l'utilisation si des effets secondaires sont observés. Si la condition ne s'améliore pas, consulter un vétérinaire. Ne PAS administrer par la gueule. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. **CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

MISES EN GARDE

PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux et les vêtements. Porter des gants en caoutchouc lors de l'application du produit. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps ayant été en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

2020-5495

2020-12-18

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Toxique pour les chats. Le contact avec un chien récemment traité peut être nocif et même mortel pour un chat qui fait sa toilette à proximité ou qui entre en contact avec un chien traité. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux de petite taille sont davantage susceptibles de manifester des effets indésirables. Observer l'animal attentivement. Nocif en cas d'ingestion.

Effets secondaires: Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Hartz Canada, Inc. au 1-800-275-1414.

PREMIERS SOINS

PERSONNES : **INGESTION** : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS** : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **CONTACT AVEC LES YEUX** : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal de compagnie en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin ou un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. Il n'y a pas d'antidote spécifique.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments et hors de la portée des enfants. Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

Pour plus d'information, appeler un de nos experts au 1-800-275-1414

Consulter le site www.hartzultraguard.com

Hartz® et les autres marques de commerce sont des marques déposées de The Hartz Mountain Corporation

RMXXXXXX

2020-5495
2020-12-18

Texte figurant sur le tube

Hartz® UltraGuard®
Gouttes antipuces et antitiqques pour chiens et chiots de plus de 14 kg (30 lb)

DOMESTIQUE

Perméthrine..... 45 %

N° D'HOMOL. 25922 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

CONTENU NET : 2 mL

Hartz Canada, Inc.
1125, rue Talbot
St. Thomas, Ontario
N5P 3W7
1-800-275-1414

RMXXXXXX