

2019-6497
2020-06-04

(Front-French)

(Virbac ANIMAL HEALTH Logo) **ECTO-SPRAY^{MC}**

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

PYRÉTHRINES À BASE D'EAU AVEC FARINE D'AVOINE ÉMOLLIENTE, EN AÉROSOL, POUR TUER LES PUCES ET LES TIQUES CHEZ LES CHIENS, LES CHIOTS, LES CHATS ET LES CHATONS

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF

Pyréthrine.....	0,10%
Butoxyde de pipéronyle	0,20%
n-Octyl bicycloheptène dicarboximide.....	0,33%

Contient les agents de conservation suivants :

Parabène de propyle.....	0,024%
Parabène de méthyle.....	0,088%
Imidazolidinyl Urée	0,24%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Consulter le panneau latéral pour les mises en garde additionnelles.

NO. D'ENR. 23999 LPA CONTENU

NET : 473 mL

FABRIQUE AUX E. U. PAR :

Neogen Corporation
620 Leshler Place
Lansing, MI 48912, U.S.A.
Medical: 1-800-498-5743
?: 1-800-621-8829

(Back-French)

MISES EN GARDE: Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, idéalement en plein air. **NE PAS** laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non ciblées. **HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si avalé. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver les mains après usage. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne vaporiser ni sur la face, ni dans les yeux, ni sur les parties génitales des animaux durant le traitement. Consulter un médecin vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des femelles gestantes, des animaux malades, ou des animaux recevant des médicaments ou d'autres traitements antiparasitaires. Ne pas l'utiliser sur des femelles allaitantes ni sur des animaux âgés de moins de 8 semaines. Cesser d'utiliser le produit si des effets indésirables sont observés.

PREMIERS SOINS – HUMAINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu expressément la directive d'un professionnel du centre antipoison ou d'un médecin. N'administrer aucun liquide à la personne. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** maintenir les paupières ouvertes et rincer l'œil lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer, s'il y a lieu, les verres de contact après les cinq premières minutes, puis continuer de rincer l'œil. Contacter un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** retirer les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Contacter un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation,** transporter la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** De la sensibilité peut survenir après l'utilisation de TOUT produit antiparasitaire pour animaux de compagnie. Si des signes de sensibilité surviennent, laver l'animal avec un savon doux et le rincer à grande eau. Si les signes persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire. Garder avec soi le contenant, l'étiquette du contenant ou le nom du produit ainsi que son numéro d'enregistrement de produit antiparasitaire au moment d'obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI :

POUR TUER LES PUCES ET LES TIQUES CHEZ LES CHIENS, LES CHIOTS, LES CHATS ET LES CHATONS.

NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.

2019-6497
2020-06-04

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

Vaporiser sur l'animal à une distance de 15 à 30 centimètres. Ébouriffer le pelage et vaporiser à rebrousse-poil jusqu'à ce que tout le pelage soit mouillé. Le traitement devrait mouiller les tiques complètement. Laisser sécher le pelage avant de le brosser ou de le peigner.

Répéter le traitement autant de fois que nécessaire, mais pas plus d'une fois tous les deux jours.

Bien vaporiser à l'intérieur de la niche ou dans toute autre pièce où couche l'animal. Pour un contrôle efficace des puces et des tiques, le traitement de l'animal doit être combiné au nettoyage et à la désinfection de tous les lieux auxquels il a accès. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis, les meubles, etc. (jeter le sac après usage), et laver le coussin et la literie de l'animal, de même que les pièces où il vit et les endroits environnants. Si le problème persiste, un traitement insecticide des lieux peut s'avérer nécessaire.

TOILETTAGE : Maintient la peau et le pelage en bon état grâce à la farine d'avoine émoulinée.

DÉSODORISANT : Donne une bonne odeur résiduelle.

ENTREPOSAGE : Garder dans un contenant fermé, dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.