

Label Update 08-JUN-2010

ACTIVE-3

DOMESTIQUE

VENDU PAR L'ENTREMISE DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Tue les puces, les tiques et les moustiques

1 TUBE-APPLICATEUR – 1 BOÎTE D'UNE DOSE POUR PETITS CHIENS.

[2 TUBES-APPLICATEURS – 1 BOÎTE D'UNE DOSE POUR GRANDS CHIENS ou 1 BOÎTE DE 2 DOSES POUR PETITS CHIENS].

[3 TUBES-APPLICATEURS – 1 BOÎTE DE 3 DOSES POUR PETITS CHIENS].

- Contrôle les puces pendant 3 semaines.
- Inhibe le développement des œufs de puce pendant 3 mois.
- Contrôle les tiques, incluant la tique du chevreuil (*Ixodes scapularis*) qui peut transmettre l'organisme responsable de la maladie de Lyme, pendant 3 semaines.
- Contrôle les moustiques pendant 3 semaines.

GARANTIE :

Perméthrine45,0%

Pyriproxyfène5,0%

N° HOM. 26620 LOI P.A.

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

ATTENTION



POISON

Toxique pour les chats

Contenu net: 1 tube-applicateur de 1,5 ml [2 tubes-applicateurs de 1,5 ml] [3 tubes-applicateurs de 1,5 ml].



**2000 Chemin Georges, Lavaltrie, Québec J5T 3S5
1-800-363-1700**

Note: ITALIQUE = Texte alternatif

Active-3 est un produit efficace et facile à utiliser. **Active-3** empêche les œufs de puces déposés sur les chiens traités de se développer en adultes, et ce, pendant 3 mois. **Active-3** contrôle les puces, les tiques sanguines du chien et les tiques américaines du chien pendant 3 semaines. **Active-3** tue la tique du chevreuil (qui peut être vecteur de l'organisme responsable de la maladie de Lyme) pendant 3 semaines. Les tiques déjà présentes sur l'animal lors du traitement peuvent mettre plusieurs jours pour mourir.

Pour un contrôle efficace des puces et des tiques, le traitement de l'animal devrait être combiné à un nettoyage de tous les endroits fréquentés par ce dernier. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis, les meubles, etc. (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et tous les endroits qu'il fréquente. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire de traiter les locaux avec un insecticide spécialement formulé à cette fin.

MODE D'EMPLOI:

GARDER L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE Utiliser SEULEMENT chez les chiens et les chiots âgés de 12 semaines ou plus. **NE PAS UTILISER CHEZ LES CHATS OU AUTRES ANIMAUX. NE PAS UTILISER CHEZ LES CHIENS DE PLUS DE 30 KG.** Ne pas administrer par la gueule. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Des applications répétées peuvent être nécessaires (ex. si l'infestation de puces persiste), mais ne pas appliquer plus d'une fois toutes les 3 semaines. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème. **SI LE PROBLÈME IMPLIQUE SEULEMENT LES TIQUES ET LES MOUSTIQUES, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'UTILISER UN PRODUIT CONTENANT DU PYRIPROXYFÈNE.** L'efficacité du produit peut être altérée par le lavage de l'animal. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Pour les chiens pesant moins de 15 kg (1 tube-applicateur): Appliquer le contenu d'un tube (1,5 ml) de **Active-3** sur le dos du chien, au niveau de la peau entre les omoplates.
Pour les chiens pesant entre 15 et 30 kg (2 tubes-applicateurs): Appliquer le contenu d'un tube (1,5 ml) de **Active-3** sur le dos du chien, au niveau de la peau entre les omoplates et un deuxième tube (1,5 ml) au niveau de la peau, directement devant la base de la queue.

Pour les chiens pesant entre 15 et 30 kg (1 tubes-applicateur): Appliquer le contenu d'un tube (3,0 ml) de **Active-3** sur le dos du chien au niveau de la peau entre les omoplates. Retirer le tube-applicateur de l'emballage en déchirant le carton le long des pointillés. Tenir le tube avec l'extrémité encochée qui pointe vers le haut, loin du visage et du corps et déchirer cette extrémité vis-à-vis l'encoche. Positionnez le bout du tube sur le dos du chien entre les omoplates et ressez-le pour faire sortir la moitié du contenu. Inversez le tube applicateur verticalement et allez à la queue du chien. Positionnez le bout du tube à la base de la queue et appliquez le reste du contenu du tube en haut de la croupe du chien, près de la base de sa queue. Emballer le tube et le jeter aux ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS - PERSONNES:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Empêcher les enfants et les bambins de toucher au chien après l'application et ce, jusqu'à ce que le produit soit complètement sec. Ne pas utiliser sur les humains. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption par la peau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Peut causer de l'irritation au niveau des yeux. Porter des gants lorsque vous appliquez le produit. Se laver soigneusement les mains après la manipulation du produit.

PRÉCAUTIONS - ANIMAUX DE COMPAGNIE :

Pour usage externe chez les chiens seulement. Ne pas utiliser chez les femelles qui allaitent ou les animaux de moins de 12 semaines. Cesser d'utiliser le produit si des effets indésirables sont observés. Si la condition persiste, consulter votre vétérinaire.

NE PAS UTILISER CHEZ LES CHATS ou animaux autres que les chiens. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités sont exposés à un risque d'effets nocifs, incluant la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière. □□□□□□□□

Réaction indésirables : Certains animaux peuvent être sensibles aux ingrédients contenus dans ce produit. Les réactions chez le chien incluent la sensibilité cutanée. Les chiens traités peuvent présenter de la léthargie, une augmentation du prurit (démangeaisons), de l'érythème (rougeur), une éruption cutanée, une décoloration ou une perte de poils au site d'application. Observer le chien après l'application. Si une sensibilité au produit survient, cesser l'utilisation et laver.

□ □

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison

ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. □ □

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: S'il y a des signes de sensibilisation persistents, consulter immédiatement un vétérinaire.

ACTIVE-3

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Perméthrine45,0%
Pyriproxyfène5,0%

N° HOM. 26620 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

ATTENTION



POISON

Toxique pour les chats

1,5 ml

 **Vétoquinol**

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))