

2017-1596
2018-03-21

L'homologation de ce produit a été révoquée le 07 juin 2023.
La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

Doktor Doom tueur d'insectes rampants

Tue: Araignées, blattes, grillons, lépismes argentés, fourmis, puces du chien et du chat, anthrènes des tapis et tiques sanguines

DOMESTIQUE

AÉROSOL DE CONTACT

ATTENTION EXPLOSIF

PRINCIPE ACTIF:

Pyréthrine 0,25 %

Butoxyde de pipéronyle 1,25 %

No D'HOMOL. 27177 L.P.A.

CONTENU NET:

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

753146 AB Ltd. o/a UltraSol Industries*

10755-69, Avenue

Edmonton (Alberta) Canada

T6H 2C9

www.doktordoom.com

(780) 432-6535

*Société appartenant entièrement à des intérêts canadiens et exploitée par des Canadiens

Pas de CFC

Ce produit n'a jamais contenu de CFC

MODE D'EMPLOI:

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la bonbonne en position verticale à au moins 120 cm de tout objet et orienter la buse loin de soi. Vaporiser en appuyant fermement sur le bouton.

USAGE À L'INTÉRIEUR:

Insectes rampants: Blattes, fourmis, araignées, lépismes argentés, grillons, mille-pattes et anthrènes des tapis. Vaporiser À FOND dans les endroits où se cachent les insectes nuisibles, par exemple, les fentes, les fissures, les ouvertures autour des éviers, des tuyaux d'évacuation et de la tuyauterie, sous les réfrigérateurs, les plinthes, les endroits humides, derrière les armoires et les aires d'entreposage.

Fourmis: Vaporiser le produit sur les pistes de fourmis, autour des cadrages de porte et de fenêtre ou dans les nids de fourmis. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués.

Punaises des lits: Vaporiser légèrement le matelas, surtout autour des coutures et de la bourre.

Démanteler le lit, puis vaporiser le cadre de lit et les ressorts, y compris les joints. Répéter au besoin.

Pour supprimer les puces et les tiques sanguines: Vaporiser les endroits infestés, notamment les endroits où l'animal se couche ou se repose, les fentes et les crevasses derrière et le long des plinthes, les cadres de porte et de fenêtre, et les endroits précis sur les planchers et les couvre-planchers où ces insectes nuisibles peuvent se trouver. Jeter la vieille litière après le traitement. Les insectes doivent être atteints par le produit pour être tués.

MISES EN GARDE:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer le contenant dans l'eau chaude ou près des radiateurs et des fours ou de toute autre source de chaleur; ne pas entreposer à une température dépassant 50 °C. Couvrir les aquariums et éloigner les animaux de compagnie pendant une heure lorsqu'on traite une pièce. Dans les résidences ou les demeures, enlever ou couvrir toute nourriture exposée et les ustensiles de cuisson avant le traitement. Éviter tout contact avec la peau, les yeux, et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de vaporisation. Se laver après l'utilisation. Craint le gel. Ne pas utiliser sur les fougères.

ÉLIMINATION:

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle puis jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien

administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

Visiez notre site: www.doktordoom.com