

**LATER'S™
Bugban-C
Poudre Anti -Fourmis**

Insecticide prêt à employer.
Pour usage extérieur.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 27068 LOI P.A.

GARANTIE : carbaryl 5 %

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

500 g, 1 kg

Spectrum Brands IP Inc.,
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

Les fourmis sont des détritivores. Elles peuvent être noires, brunes ou rouges, avec ou sans ailes. Elles ont une taille mince et leurs antennes ont une articulation. À la recherche de leur nourriture, elles entrent dans les maisons ou grimpent les arbres pour ramasser "la miellée" produite par les pucerons et les cochenilles.

1 m = approx. 1 enjambée

25 m² = 5 m x 5 m

MODE D'EMPLOI : La Poudre Anti-fourmis de Later est prête à employer. Saupoudrer au taux de 500 g sur 25 m².

PELOUSES ET GAZONS : Couper le gazon avant l'application. Ne pas arroser pendant les deux jours suivants l'application. Répéter 2 ou 3 semaines plus tard si c'est nécessaire.

Supprime : fourmis, punaises des céréales, noctuelles des arbres fruitiers, perce-oreilles, légionnaires d'automne, puces, cicadelles, mille-pattes, pyrales des prés.

Traitement LOCALISÉ pour les FOURMILIÈRES : Appliquer la poudre par dessus et autour de chaque fourmilière.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter l'inhalation et le contact avec la peau. Laver les mains après utilisation et avant de boire, manger ou fumer. Éviter toute contamination des aliments pour humains ou pour animaux.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Ce produit est extrêmement toxique pour les abeilles. Ne pas utiliser dans les endroits où elles butinent.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, FAIRE VOMIR en donnant 2 verres d'eau tiède à la personne incommodée et insérer un doigt jusqu'au fond de sa gorge. Contacter un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux**, laver à grande eau pour 15 minutes et obtenir de l'aide médicale. **En cas de contact avec la peau**, bien se laver à l'eau et au savon. **En cas d'inhalation**, obtenir des soins médicaux à l'hôpital. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le Carbaryl est un inhibiteur modéré et réversible de la cholinestérase. Les symptômes d'empoisonnement sont les maux de tête, la nausée, le vomissement et une vision embrouillée. L'atropine est un antidote.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant d'origine et dans un endroit frais et sec loin des aliments.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper avant de le jeter avec les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.