

(Container)



# Glyphosate 18 % Concentré herbicide soluble

- POUR LE CONTRÔLE DES GRAMINÉES ET DES MAUVAISES HERBES
- ÉLIMINE LA PLANTE ENTIÈRE, Y COMPRIS LES RACINES
- AUCUNE ACTIVITÉ RÉSIDUELLE DANS LE SOL
- IMPERMÉABLE EN 2 HEURES

Le concentré herbicide soluble Glyphosate 18 % peut servir aux usages suivants : traitement des bordures de gazon, contrôle des mauvaises herbes sur les terrasses, régénération des pelouses et jardins et traitement des endroits difficiles à tondre.

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Glyphosate 143 g/L  
(présent sous forme d'isopropylamine)

N° D'HOMOLOGATION 27351 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**ATTENTION : IRRITE LES YEUX  
DANGEREUX SI AVALÉ**

CONTENU NET : 1L jusqu'à un maximum de 4 L

**Corteva Agriscience Canada Company** 2450, 215 – 2nd Street S.W.  
Calgary, Alberta  
T2P 1M4  
1-800-667-3852

™ Marques des Corteva Agriscience et sociétés affiliées.

## **PRÉCAUTIONS**

### **ATTENTION : IRRITE LES YEUX**

### **DANGEREUX SI AVALÉ**

Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau. Ne laisser personne, notamment les enfants et les animaux domestiques, circuler sur les zones de traitement pendant l'application, ni les laisser pénétrer dans les zones traitées avant que la solution de pulvérisation n'ait séché. Se laver immédiatement après avoir utilisé ce produit.

## **PREMIERS SOINS**

**Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.**

**En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Il n'existe pas d'antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à instaurer en fonction des réactions du patient.

Pour de plus amples renseignements, se référer à la fiche signalétique du produit.

## **ENTREPOSAGE**

Ne pas expédier ni entreposer près des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques ou des vêtements. Éviter de contaminer l'eau, les produits d'alimentation, les semences ou les aliments pour animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination.

## **ÉLIMINATION**

Mettre le contenant vide dans les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant.

(Booklet)



# Glyphosate 18 % Concentré herbicide soluble

- POUR LE CONTRÔLE DES GRAMINÉES ET DES MAUVAISES HERBES
- ÉLIMINE LA PLANTE ENTIÈRE, Y COMPRIS LES RACINES
- AUCUNE ACTIVITÉ RÉSIDUELLE DANS LE SOL
- IMPERMÉABLE EN 2 HEURES

**Le concentré herbicide soluble Glyphosate 18 % peut servir aux usages suivants : traitement des bordures de gazon, contrôle des mauvaises herbes sur les terrasses, régénération des pelouses et jardins et traitement des endroits difficiles à tondre.**

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Glyphosate 143 g/L  
(présent sous forme d'isopropylamine)

N° D'HOMOLOGATION 27351 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**ATTENTION : IRRITE LES YEUX  
DANGEREUX SI AVALÉ**

CONTENU NET : 1L jusqu'à un maximum de 4 L

**Corteva Agriscience Canada Company** 2450, 215 – 2nd Street S.W.  
Calgary, Alberta  
T2P 1M4  
1-800-667-3852

™ Marques des Corteva Agriscience et sociétés affiliées.

## **PRÉCAUTIONS**

### **ATTENTION : IRRITE LES YEUX**

### **DANGEREUX SI AVALÉ**

Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau. Ne laisser personne, notamment les enfants et les animaux domestiques, circuler sur les zones de traitement pendant l'application ni les laisser pénétrer dans les zones traitées avant que la solution de pulvérisation n'ait séché. Se laver immédiatement après avoir utilisé ce produit.

## **PREMIERS SOINS**

**Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.**

**En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Il n'existe pas d'antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à instaurer en fonction des réactions du patient.

Pour de plus amples renseignements, se référer à la fiche signalétique du produit.

## **ENTREPOSAGE**

Ne pas expédier ni entreposer près des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques ou des vêtements. Éviter de contaminer l'eau, les produits d'alimentation, les semences ou les aliments pour animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination.

## **ÉLIMINATION**

Mettre le contenant vide dans les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant.

## **RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

Le concentré herbicide soluble Glyphosate 18 %, un herbicide de débroussaillage non sélectif, contrôle la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les herbes à pelouse, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (c'est-à-dire, à peu près tout ce qui est vert et en croissance). Absorbé par les feuilles, cet herbicide systémique circule dans la tige et les racines pour contrôler la plante entière. Compter trois jours pour voir apparaître les symptômes visibles de l'application de l'herbicide et la plante est éliminée en 2-4 semaines. NOTE : Le Glyphosate 18 % n'agit pas dans le sol et ne nuit pas à la végétation environnante par lixiviation ou ruissellement. Pour agir, l'herbicide doit être appliqué sur les plantes présentes. Il faut répéter les applications au fur et à mesure qu'émergent les jeunes plants et la nouvelle végétation.

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI

ATTENTION : Éviter de pulvériser sur les plantes utiles, car toute plante touchée par l'herbicide peut être éliminée. Ne pas pulvériser par temps venteux. Ne pas pulvériser jusqu'au point de ruissellement. La pluie ou un arrosage, deux heures près l'application, ne nuisent pas à l'efficacité du produit. Toutefois, une pluie abondante immédiatement après l'application peut éliminer le produit chimique du feuillage et il peut être nécessaire de reprendre le traitement. Ne pas appliquer si l'on prévoit de la pluie pour la période d'application.

Le glyphosate ne doit pas être appliqué à l'aide d'applicateurs manuels à mèche ou par badigeonnage à la main.

### MODE D'EMPLOI

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT D'UTILISER. LE DÉFAUT DE SUIVRE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE PEUT DONNER DE MAUVAIS RÉSULTATS OU ENDOMMAGER LES PLANTES.

Ne pas reformuler ni réemballer.

### DIRECTIVES D'APPLICATION

UTILISATION	DIRECTIVES D'APPLICATION	LE PRODUIT SUPPRIME	MÉLANGE/ SUPERFICIE COUVERTE
Contrôle de la végétation indésirable (p. ex., les endroits difficiles à tondre, autour des bâtiments). Traitement des bordures de gazon, contrôle des mauvaises herbes sur les terrasses, terrains vacants, lieux d'entreposage et d'activités récréatives, entrées	Appliquer sur les plantes en pleine croissance, sur les graminées annuelles après l'émergence. Pour les graminées vivaces, appliquer après l'apparition des tiges porte-graines, des fleurs ou des baies.	La plupart des graminées annuelles et vivaces, comme le chiendent, la stellaire, la petite herbe à poux, la renouée, l'herbe à puce, le chardon du Canada, l'asclépiade commune, le liseron.	1) Mélanger 100 mL du produit dans 2,0 L d'eau claire (1 partie de Glyphosate 18 % pour 20 parties d'eau). 2) Appliquer la solution préparée sur l'équivalent de 40 mètres carrés (10 pas x 4 pas <sup>†</sup> ).
Autour des arbres/arbustes/plantes ornementales	Appliquer soigneusement autour de la base. Éviter le contact par pulvérisation ou dérive avec le feuillage, les tiges ou l'écorce verte des plantes utiles.		3) Pulvériser uniformément et complètement, mais éviter le ruissellement.

Régénération pelouse/jardin	Pour de meilleurs résultats sur les pelouses, sauter une tonte avant le traitement. Laisser agir pendant au moins 3 jours avant de travailler la terre ou de replanter.		Note : Ne mélanger que la quantité requise de la solution de pulvérisation pour le traitement de la zone visée. Rincer soigneusement le pulvérisateur après chaque utilisation. Ne pas laisser le mélange dans le pulvérisateur pendant des périodes prolongées.
Destruction des broussailles	Appliquer après l'ouverture complète des feuilles. Ne traiter que les arbres et les broussailles d'une hauteur maximale de 1,5 m; pour les plantes plus grandes, couper et appliquer sur les repousses.	La plupart des broussailles, notamment les broussailles de peuplier, d'aulne, d'érable et de framboisier	Ne pas utiliser de pulvérisateurs à cartouche (fixés à l'extrémité du tuyau d'arrosage).  † 1 pas = approx. 1 mètre

™ Marques des Corteva Agriscience et sociétés affiliées.