

2013-11-22

2013-1889

OFF!<sup>®</sup>  
protectionfamiliale<sup>MC</sup>  
chasse-moustiques en vaporisateur  
destiné aux enfants

Fraîcheur tropicale<sup>MC</sup>

ATTENTION



INFLAMMABLE

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : DEET et toluamides actifs apparentés 5 %.

N° D'HOM. 27325 LOI P.A.

175 mL

SC Johnson  
UNE ENTREPRISE FAMILIALE

OFF!® protectionfamiliale<sup>MC</sup> en vaporisateur « destiné aux Enfants » contient de l'aloès et repousse les moustiques pendant 2 heures. Le produit repousse également les mouches noires, les mouches piquantes des ét ables, les tiques, les aoûtats, les brûlots et les mouches à chevreuil. Non gras. Ne tache pas.

**MODE D'EMPLOI :** Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement au besoin. Appliquer de nouveau au bout de 2 heures s'il y a lieu. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans les endroits clos.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Superviser les applications chez les enfants. **NE PAS UTILISER SUR LES BÉBÉS ÂGÉS DE MOINS DE 6 MOIS.** Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'appliquer sur les mains. Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, la rayonne, le dy nel, l'acétate, les plantes, le fini des meubles, les matières plastiques et les surfaces peintes. Tenir loin de la flamme nue et des étincelles.

**PREMIERS SOINS:** En cas d'irritation ou si d'autres effets indésirables se manifestent, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux. **En cas de contact oculaire :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Questions ou commentaires? Composer le 1-800-558-5566, ou écrire à Helen Johnson. Off.ca

®/MC S. C. Johnson & Son, Inc. utilisée sous licence et IMPORTÉ PAR S. C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE, 1 WEBSTER ST, BRANTFORD ON, CANADA N3T 5R1

POUR VENTE AU CANADA SEULEMENT.

Une entreprise familiale depuis 1886 Fisk Johnson