

## Insectifuge Mosquito Shield

BOUILLIE SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets).

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE :

DEET plus toluamides apparentés actifs  
(isomères de ortho et para) 25%

NO. D'HOM. 27636 LOI P.A.

CONTENU NET: 250 g

DANGER



EXTRÊMEMENT  
INFLAMMABLE



RISQUE  
D'EXPLOSION

KUU Sport Mfg. Ltd.  
450 Tapscott Road, Unit 5 & 6A  
Toronto, ON  
M1B 1Y4

**MODE D'EMPLOI :** Repousse les moustiques (maringouins) pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage  
**POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, poêles ou autre source de chaleur. Ne pas percer ou jeter le contenant au feu ni conserver à une température de plus 50°C. Ne pas utiliser près d'une flamme vive, d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans. Éviter tout contact avec le plastique et les tissus tels que l'acétate, le rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, plastiques et surfaces peintes.

**PREMIERS SOINS :** Si les yeux sont atteints : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.  Si avalé, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.  S'il y a inhalation de produit, placer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.  Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression et jeter dans les ordures ménagères.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )