

AGRICOLE

**ENHANCE**

Adjuvant non ionique pour bouillie dérivé de l'huile de soya

Pour usage avec les produits antiparasitaires figurant sur la présente étiquette.

PRINCIPE ACTIF : Éthoxylate de triglycéride 10 POE ..... 80 %

Avertissement, contient l'allergène soya

Concentré émulsifiable

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
N° D'HOMOLOGATION 29270 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 1 -1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.  
C. P. 31097  
Guelph (ON)  
N1H 8K1  
519-821-3633

**AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

**PREMIERS SOINS**

**EN CAS D'INGESTION :**

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :**

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION :**

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :**

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Traiter selon les symptômes.

## MISES EN GARDE

### TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

### MANIPULATION DU PRODUIT

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage des déversements et du pulvérisateur, l'entretien et les réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Entreposer à l'écart de la nourriture humaine ou animale. Ne pas contaminer l'approvisionnement en eau, les zones humides et toute autre étendue d'eau par application directe du produit, dérive de pulvérisation et lors du nettoyage ou du rinçage de l'équipement de pulvérisation ou des contenants.

### DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT

Les travailleurs ne doivent pas retourner dans les champs traités avant la fin du délai de sécurité indiqué sur l'étiquette du pesticide appliqué en association avec ENHANCE.

### ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un lieu sûr entre chaque utilisation. Conserver à l'écart des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

### NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Récupérer le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile granulée, terre) et jeter dans un contenant à déchets. Laver la zone de déversement avec de l'eau après avoir ramassé la matière, puis jeter avec les déchets. Voir la section ÉLIMINATION ci-dessous.

### ÉLIMINATION

#### CONTENANTS RECYCLABLES

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'adresser au distributeur ou au détaillant ou encore à l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

#### CONTENANTS RÉCUPÉRABLES:

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

#### CONTENANTS RÉUTILISABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : À toute heure, 613-787-5620 SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

## MODE D'EMPLOI

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

Les doses d'ENHANCE indiquées ci-dessous s'appliquent aux bouillies de pulvérisation préparées avec un produit antiparasitaire ou à d'autres usages. Les bouillies de pulvérisation à base de produit antiparasitaire, leur préparation et leurs usages doivent être dérivées des étiquettes de produits antiparasitaires individuelles.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité d'ENHANCE par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
ACTIVOL	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises douces et aigres
Fongicide MIRAVIS® ACE	125 mL/100L	Sur le blé. Ajouter ce produit après tous les autres ingrédients.
Fongicide MIRAVIS Bold	125 mL/100L	Sur le canola. Ajouter ce produit après tous les autres ingrédients.
MIRAVIS Era A	125 mL/100L	Consulter l'étiquette pour connaître le mode d'emploi.
FALGRO Comprimés Régulateur De Croissance	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises aigres
FOLICUR 432 F Fongicide foliaire, FUSE Fongicide foliaire, PALLISER Fongicide foliaire, Soraduo B, Tebustar 432, Toledo 430 SC Foliar Fongicide	1,25 L/1 000L	Consulter l'étiquette pour connaître le mode d'emploi.
PROLINE 480 SC Fongicide foliaire, PROSARO 421 SC Fongicide. Foliaire, Prosaro Pro	1,25 L/1 000L	Proline 480 SCm et PROSARO 421 SC doit être dispersé à fond avant d'ajouter ENHANCE.
HERBICIDE VALTERA	1,25 – 2,5 L/1000L	Emploi comme aide à la récolte pour l'haricot sec ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.). Utiliser la dose la plus élevée lorsque la couverture est dense et/ou la pression exercée par les mauvaises herbes est plus élevée. Consulter l'étiquette d'Herbicide Valtera pour connaître le mode d'emploi.
AMBUSH 500EC Insecticide, POUNCE 384 EC Insecticide	300 mL/1 000 L	Pour usage sur les choux
Everest 3.0 AG Herbicide, Sierra 3.0 AG Herbicide	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur
AXIAL 100 EC Herbicide	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur l'orge de printemps, le blé de printemps
REGLONE Défanant, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Drifast Dessicant, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica	1 L/1 000 L	Ne pas utiliser ENHANCE avec REGLONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Drifast Dessicant, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica pour supprimer la spargoute des champs. Ne pas utiliser ENHANCE avec RELGONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Drifast Dessicant, Amrory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica pour défaner les pommes de terre, sauf pour l'usage recommandé dans les provinces des Prairies, à raison de 1,25 L/ha de REGLONE, Dessicash, Stage, Bolster Desiccant, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Drifast Dessicant, Armory 240 Herbicide, Guardsman Diquat, Desica.
PINNACLE Toss-N-Go Herbicide, PINNACLE SG Herbicide, REFLEX Herbicide, HERBICIDE TELAR Pochettes Toss-N-Go, Herbicide Telar XP	1 L/1 000 L	Ajouter ENHANCE en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité d'ENHANCE par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
<p>ACCENT Herbicide, ALLY Herbicide, REFINE EXTRA 75 DF Herbicide, REFINE EXTRA 75 TOSS-N-GO Herbicide, Refine SG Herbicide, Refine SG Toss-N-Go Herbicide, PRISM HERBICIDE 25% DF, PRISM SG HERBICIDE, HERBICIDE MUSTER, PEAK 75WG Herbicide, HERBICIDE CLASSIC, ESCORT Herbicide, SPARTAN HERBICIDE GRANULES DISPERSABLES DANS L'EAU, FLORAFULAM 50 SC HERBICIDE, CALLISTO 480SC HERBICIDE, DESTRA HERBICIDE, ENGARDE HERBICIDE, PREPASS FLEX HERBICIDE, SPITFIRE 50 SC HERBICIDE, NUFARM CHAPERONE HERBICIDE, NUFARM BOOST HERBICIDE, BARRICADE SG HERBICIDE, DEPLOY 75 DF HERBICIDE, COMPAS 480 EC Herbicide sélectif émulsifiable, CURTAIL M HERBICIDE, LONTREL 360 HERBICIDE, PARDNER, NUFARM KORIL 235 Herbicide liquide, CLEARVIEW HERBICIDE, SIGHTLINE A HERBICIDE, RECLAIM A HERBICIDE (Reclaim A Herbicide + Reclaim B Herbicide), RECLAIM II HERBICIDE (Reclaim II A Herbicide + Reclaim II B Herbicide), FBN Chlari Herbicide, Hinge Herbicide</p>	2 L/1 000 L	Ajouter ENHANCE en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi.
<p>PURSUIT 240, PURSUIT Herbicide pour fèves de soya (agricole), PURSUIT Herbicide, PURSUIT 70 DG Herbicide, ODYSSEY, FULFILL 50WG INSECTICIDE, INTREPID INSECTICIDE, ADRENALIN SC HERBICIDE, DELEGATE IINSECTICIDE, GUARDSMAN GLADIATOR, IMAZETHAPYR 75 WDG, PREDICADE GRASS HERBICIDE, VARRO HARBICIDE, DISTINCT Herbicide, DISTINCT HERBICIDE, DISTINCT WDG Herbicide, UPBEET DF 50%, AC 299,263 70 WDG, AIM EC Herbicide, SIGNAL Herbicide, NUFARM CLODINAFOP Herbicide, NUFARM SIGNAL HERBICIDE, LADDER 240 EC, SLAM'R CLODINAFOP Herbicide, SLAM'R HERBICIDE, CADILLAC UNPACKED, OVERDRIVE Herbicide, BULLWHIP 240 EC HERBICIDE, CURRENT 240 EC Herbicide, FOAX Herbicide, AGROGILL CLODINAFOP 240EC, HERBICIDE ASSURE II, YUMA GL, TRUVIST HERBICIDE, NAVIUS HERBICIDE, NAVIUS VM HERBICIDE, SIMPLICITY, SIMPLICITY GODRI HERBICIDE, TANDEM GoDRI A., NU-IMAGE HERBICIDE, PHANTOM 240SL</p>	2,5 L/1 000 L	<p>Ajouter ENHANCE en dernier. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi. Pour la dose supérieure de SIGNAL Herbicide, NUFARM CLODINAFOP Herbicide, NUFARM CLODINAFOP Herbicide, NUFARM SIGNAL Herbicide et ADAMA LADDER 240 EC Herbicide, SLAM'R CLODINAFOP Herbicide, SLAM'R HERBICIDE, CADILLAC, CURRENT 240 EC Herbicide, FOAX Herbicide, HARMONY GRASS 240 EC Herbicide, AGROGILL CLODINAFOP 240EC et BULLWHIP 240 EC Herbicide 290 mL/ha, utiliser avec ENHANCE à 0,32 % vol/vol (3,2L/1000L).</p> <p>Pour utilisation avec Yuma GL ou Herbicide Assure II appliquer 2,5-5,0L/1,000L (0,25-0,50% v/v). Utiliser la concentration la plus élevée lorsque les conditions de croissance ne sont pas favorables pour les mauvaises herbes ciblées. Voir les étiquettes des produits.</p>
ELEVATE 50 WDG	200 mL/1 000 L	Pour usage sur le raisin

