

Spray sous pression pour coquerelles MULTICIDE® 27341

Mort aux coquerelles

Tue les parasites intérieurs rampants : fourmis, coquerelles, grillons et autres parasites indiqués

À USAGE DOMESTIQUE

NO D'HOMOLOGATION 27385

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE :

| | |
|---|---------|
| Imiprothrine ([2,5-Dioxo-3-(2-propynyl)-1-imidazolidinyl]méthyl (1RS)-cis, trans-chrysanthémate)..... | 0,400 % |
| d-phénothrine (Sumithrin™)..... | 0,500 % |
| *Dicarboximide de N-octylbicycloheptène..... | 0,980 % |

* MGK® 264 synergiste d'insecticide

MULTICIDE®, MGK® - Marques déposées de McLaughlin Gormley King Co.
Sumithrin® - Marque déposée de Sumitomo Chemical Company, Ltd.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT - IRRITANT DE LA PEAU
SENSIBILISANT DE LA PEAU POSSIBLE



EXPLOSIF

CONTENU NET _____

Fabriqué par:



8810 Tenth Avenue North
Minneapolis, MN 55427
U.S.A.
(763) 544-0341

EPA Est. No. 1021-MN-2

MODE D'EMPLOI :

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur dans les résidences (maisons/appartements individuels). Le Spray sous pression pour coquerelles MULTICIDE® 27341 offre une vaporisation rapide et fait sortir les coquerelles germaniques de leurs cachettes pour ensuite les tuer. Le Spray sous pression pour coquerelles MULTICIDE® 27341 devrait être appliqué d'une hauteur de 15 cm à un rythme de 5 secondes par mètre linéaire.

Ne pas utiliser dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

NE PAS APPLIQUER dans le cadre d'un traitement généralisé. SEULE une application le long d'un périmètre, une application localisée ou une application dans les fissures et les interstices sont autorisées. Par « application le long d'un périmètre ou application localisée », on entend une application en bande large ou tout autour d'une pièce ou dans une petite zone (< 2 pi²/0,2 m²). On entend par « applications dans les fissures et les interstices » une application, au moyen d'une buse de précision, dans les fissures et les interstices où les organismes nuisibles se réfugient ou par lesquels ils peuvent pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment. Pour ce qui est des meubles rembourrés, l'application du produit doit se limiter aux capitons et aux coutures ou être localisée.

TRAITEMENT DES FISSURES ET LÉZARDES :

Utilisez le Spray sous pression pour coquerelles MULTICIDE® 27341 avec l'activateur et le tube d'injection fournis. Injectez le produit dans les fissures et les lézardes ou les creux où les insectes peuvent se cacher, vivre et se reproduire. Placez l'embout de l'injecteur dans les fissures, les lézardes, les trous et autres petites ouvertures. Traitez les fissures des plinthes, autour des cadres de portes et de fenêtres, les lézardes et les fissures des armoires et des garde-manger et les ouvertures autour des tuyaux et des éviers.

Fourmis, blattes (américaines, germaniques, orientales), grillons, cloportes, araignées et tiques sanguines: pour les utilisations intérieures, dirigez l'embout de pulvérisation pour que la pulvérisation entre directement en contact avec les insectes si possible. Pulvériser dans les fissures et les lézardes et autres endroits cachés où ces parasites se cachent comme sous les évier, derrière les cuisinières et les réfrigérateurs, autour de la plomberie et autres endroits où vous voyez ces parasites. **N'EST PAS PRÉVU POUR UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ OU LOCALISÉ.** Répétez l'application au besoin lorsque vous voyez des parasites, mais pas plus d'une fois par semaine. Ventilez les pièces traitées à la fin de l'application. N'appliquez pas sur les surfaces qui pourraient être accessibles aux enfants. Lavez bien toutes les surfaces exposées telles que les plinthes, les planchers et les armoires qui sont pulvérisés en passant durant l'application dans les fissures et les lézardes.

Parasites des produits entreposés (cucujide dentelé des grains, tribolium brun de la farine, charançon du riz). Dans la cuisine, retirez et inspectez les produits alimentaires entreposés. Retirez les emballages infestés et scellez dans des sacs de plastique pour éviter la réinfestation. Jetez le sac dans la poubelle. Après avoir retiré tous les emballages d'aliments et les garnitures de tablette, pulvériser les parasites visibles, les fissures, les lézardes et les coins du garde-manger, des armoires et les endroits d'entreposage. Laissez sécher les endroits traités. Nettoyez bien tous les endroits de contact alimentaire avec de l'eau potable avant de remettre des garnitures de tablette ou remettre les contenants sur les tablettes. Répétez le traitement au besoin, mais pas plus d'une fois par semaine.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux si absorbé par la peau. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Retirez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. Évitez de respirer les vapeurs ou les embruns de pulvérisation. Le contact prolongé ou fréquent avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Lavez-vous bien après l'utilisation. **NE TRAITÉZ PAS LES ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC CE PRODUIT.**

Contenu sous pression. N'utilisez pas et ne rangez pas près de sources de chaleur ou près de flammes nues. Ne percez pas et n'incinerez pas le contenant. L'exposition à des températures de plus de 50°C peut provoquer l'éclatement.

PREMIERS SOINS :

S'il y a du produit sur la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si le produit entre dans les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si inhalé, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si ingéré, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : Toxique pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE :

Rangez dans un endroit sans danger, préférablement verrouillé qui est frais et sec.

ÉLIMINATION :

Lorsque le contenant est vide, appuyez sur la soupape pour dégager toute la pression. Jetez le contenant vide avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.