

Croc Bloc Insectifuge Légère

EN VAPORISATEUR À POMPE • DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets).

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION • GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF: DEET plus toluamides apparentés actifs ...9.8%

NO. D'HOM. 27613 LOI P. A.

CONTENU NET: 120 ml

ATTENTION



INFLAMMABLE

Croc Bloc Products Inc.  
200 Zenway Blvd., Vaughan Ontario,  
Canada L4H 0L6 • 1-800-332-1810

**MODE D'EMPLOI:** Repousse les moustiques (maringuins) pendant 3 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes de étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, poêles ou autre source de chaleur. Ne pas percer ou jeter le contenant au feu ni le conserver à une température de plus de 50°C. Ne pas utiliser près d'une flamme vive, d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les petits âgés de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants de 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, les plastiques et les surfaces peintes.

**PREMIERS SOINS:** En cas d'irritation ou d'autres effets nocifs, laver IMMÉDIATEMENT avec de l'eau et du savon. **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation ::** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression et jeter dans les ordures ménagères.

FABRIQUÉ AU CANADA