

2020-5746  
2021-01-13

VET-KEM®

OVISPOT™ PLUS

POUR CHIENS DE 14 kg (30 lb) ET PLUS  
Solution

DOMESTIQUE

PERMÉTHRINE 45 %  
(S)-MÉTHOPRÈNE 2,9 %

N° D'HOMOL. 26495 L.P.A

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
NE PAS UTILISER SUR LES CHATS  
Toxique pour les chats

WELLMARK INTERNATIONAL  
100 Stone Road West, bureau 111,  
Guelph ON N1G 5L3  
1-800-688-7378

2 mL

Blister

VET-KEM®

OviSpot™ Plus

Anti-puces et anti-tiques pour CHIENS DE 14 kg (30 lb) ET PLUS  
Solution

Avec le régulateur de croissance d'insectes (RIC) Precor®

DOMESTIQUE

[Tues] [les puces], [les tiques] [et] [les moustiques] [adultes]

[Tue les œufs de puce [pondus sur votre animal] [pendant 4 semaines]

[Facile à utiliser]

[Le produit s'étend sur tout le corps grâce aux mouvements naturels de l'animal]

[Traitement] [mensuel] contre [les puces], [les tiques] [et] [les moustiques]

[Tue [les puces], [les tiques], [les moustiques] [adultes], [les œufs de puces] [et] [les larves de puces]]

[Tue] les moustiques

[Contient un aduicticide actif contre les moustiques]

[Tue [les puces], [les tiques] et [les moustiques [adultes] [au contact]

[Tue la tique à pattes noires (tique du chevreuil)] [qui peuvent transmettre la maladie de Lyme]

[Tue] les moustiques et [la tique à pattes noires (tique du chevreuil)] [qui peuvent transmettre la maladie de Lyme]

Dose pour 3 mois

1<sup>re</sup> dose 2<sup>e</sup> dose 3<sup>e</sup> dose

PRINCIPE ACTIF: : Permethrine .....45 %

(S)-Méthoprène .....2,9 %

N° D'HOMOL. 26495 L.P.A.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

Toxique pour les chats

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS

Wellmark International

100, Stone Road West, bureau 111  
Guelph (Ontario) N1G 5L3  
1 800 688-7378

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Le produit OviSpot Plus de Vet-Kem, Contrôle anti-puces et anti-tiques pour les chiens de 14 kg (30 lb) et plus contient un insecticide puissant et efficace qui tue les puces, les tiques et les moustiques adultes au contact, et Precor, un régulateur de croissance des insectes longue durée, qui empêche les œufs et les larves de puces d'atteindre le stade adulte. Ce produit soulage les infestations de puces en tuant les puces, les œufs de puces et les larves de puces, rompant ainsi efficacement le cycle de vie de la puce. Ce produit tue les moustiques, ainsi que les tiques occidentales à pattes noires, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme.

Les puces adultes passent pratiquement tout leur temps sur l'animal de compagnie et produisent un grand nombre d'œufs qui tombent de celui-ci et se propagent dans l'environnement. Lorsque l'on peut apercevoir les puces sur l'animal, la maison est déjà infestée de puces aux stades immatures.

**MODE D'EMPLOI : NE PAS UTILISER SUR LES CHATS.** Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux qui allaitent ou sur des chiens ou des chiots âgés de moins de 6 mois. Ne PAS utiliser sur les chiens et les chiots de 14 kg (30 lb) ou moins. Ne PAS administrer par la gueule. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Cette boîte contient trois doses mensuelles de 2 mL.

1. Sortir un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale. 2. Tenir le bas du tube avec une main. 3. Avec l'autre main, défaire le capuchon et le retirer soigneusement. 4. Positionner le bout du tube sur le dos du chien, entre les omoplates, puis presser le tube pour en faire sortir tout le contenu. 5. Renverser le tube applicateur en position verticale et aller vers la queue du chien. Positionner le bout du tube à la base de la queue et appliquer le reste du contenu sur la croupe du chien, près de la base de la queue.

Attendre 4 semaines avant de faire une autre application. Réappliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. **CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

Après l'application et grâce aux mouvements naturels de l'animal, les huiles de sa peau et de ses poils transporteront le produit partout sur son corps, ce qui le protégera contre les infestations de puces, les tiques et les moustiques. Cesser l'utilisation si l'on constate des réactions indésirables. Si les effets secondaires persistent, consulter le vétérinaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème. Le produit est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un programme complet destiné à réduire les populations de puces et tiques dans l'environnement du chien. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement du chien doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par le chien. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite le chien, ainsi que les lieux voisins. Les produits anti-puces et anti-tiques Vet-Kem sont destinés à se compléter les uns les autres dans un programme global de traitement des puces et des tiques. Si le problème de

parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire (p. ex., les produits Siphotrol® de Vet-Kem). Ce produit contient Permethrine et (S)-Méthoprène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent Permethrine et (S)-Méthoprène après avoir utilisé VET-KEM OviSpot Plus Anti-puces et anti-tiques pour CHIENS DE 14 kg ET PLUS.

**MISES EN GARDE :**

**HUMAINS :**

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif en cas d'ingestion. Porter des gants de caoutchouc lors de l'application. Peut provoquer une irritation des yeux. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après avoir manipulé ou appliqué le produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps étant entré en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Empêcher le produit d'entrer en contact avec les aliments, les ustensiles de cuisine et les endroits où l'on prépare ou conserve la nourriture.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités sont exposés à un risque d'effets nocifs, incluant la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Nocif en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien.

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1- 800- 688-7378.

**PREMIERS SOINS :**

**HUMAINS :**

**INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le

bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin ou un vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer dans un endroit frais et sec.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

**AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Pour en savoir plus, appeler le numéro d'urgence sur les puces et les tiques au 1-800-688-7378 (9 h à 17 h HNE)

® Marques déposées de Wellmark International  
OviSpot est une marque de commerce de Wellmark International

Contenant

VET-KEM®

OVISPOT™ Plus

Contrôle anti-puces et tiques pour les CHIENS DE 14 kg (30 lb) ET PLUS

Solution

Avec le régulateur de croissance d'insectes (RIC) Precor®

DOMESTIQUE

[Tue] [les puces], [les tiques] [et] [les moustiques] [adultes]

[Tue les œufs de puce [pondus sur votre animal] [pendant 4 semaines]

[Facile à utiliser]

[Le produit s'étend sur tout le corps grâce aux mouvements naturels de l'animal]

[Traitement] [mensuel] contre [les puces], [les tiques] [et] [les moustiques]

[Tue les puces], [les tiques], [les moustiques] [adultes], [les œufs de puces] [et] [les larves de puces]]

[Tue] les moustiques [Contient un aduicticide actif contre les moustiques]

[Tue [les puces], [les tiques] et [les moustiques [adultes] [au contact]

[Tue la tique à pattes noires (tique du chevreuil)] [qui peuvent transmettre la maladie de Lyme]

[Tue] les moustiques et [la tique à pattes noires (tique du chevreuil)] [qui peuvent transmettre la maladie de Lyme]

Dose pour 3 mois : Comprend trois doses de 2 mL

1<sup>re</sup> dose 2<sup>e</sup> dose 3<sup>e</sup> dose

PRINCIPE ACTIF: : Permethrine .....45 %  
(S)-Méthoprène .....2,9 %

N° D'HOMOL. 26495 L.P.A.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

Toxique pour les chats

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS

Wellmark International

100, Stone Road West, bureau 111

Guelph (Ontario) N1G 5L3

1 800 688-7378

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Le produit OviSpot Plus de Vet-Kem, Contrôle anti-puces et anti-tiques pour les chiens de 14 kg (30 lb) et plus contient un insecticide puissant et efficace qui tue les puces, les tiques et les moustiques adultes au contact, et Precor, un régulateur de croissance des insectes longue durée, qui empêche les œufs et les larves de puces d'atteindre le stade adulte. Ce produit soulage les infestations de puces en tuant les puces, les œufs de puces et les larves de puces, rompant ainsi efficacement le cycle de vie de la puce. Ce produit tue les moustiques, ainsi que les tiques occidentales à pattes noires, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme.

Les puces adultes passent pratiquement tout leur temps sur l'animal de compagnie et produisent un grand nombre d'œufs qui tombent de celui-ci et se propagent dans l'environnement. Lorsque l'on peut apercevoir les puces sur l'animal, la maison est déjà infestée de puces aux stades immatures.

**MODE D'EMPLOI : NE PAS UTILISER SUR LES CHATS. Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux qui allaitent ou sur des chiens ou des chiots âgés de moins de 6 mois. Ne PAS utiliser sur les chiens et les chiots de 14 kg (30 lb) ou moins. Ne PAS administrer par la gueule. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.**

Cette boîte contient trois doses mensuelles de 2 mL.

1. Sortir un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale. 2. Tenir le bas du tube avec une main. 3. Avec l'autre main, défaire le capuchon et le retirer soigneusement. 4. Positionner le bout du tube sur le dos du chien, entre les omoplates, puis presser le tube pour en faire sortir tout le contenu. 5. Renverser le tube applicateur en position verticale et aller vers la queue du chien. Positionner le bout du tube à la base de la queue et appliquer le reste du contenu sur la croupe du chien, près de la base de la queue.

Attendre 4 semaines avant de faire une autre application. Réappliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible.

**CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

Après l'application et grâce aux mouvements naturels de l'animal, les huiles de sa peau et de ses poils transporteront le produit partout sur son corps, ce qui le protégera contre les infestations de puces, les tiques et les moustiques. Cesser l'utilisation si l'on constate des réactions indésirables. Si les effets secondaires persistent, consulter le vétérinaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème. Le produit est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un programme complet destiné à réduire les populations des puces et tiques dans l'environnement du chien. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement du chien doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par le chien. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite le chien, ainsi que les lieux voisins. Les produits anti-puces et anti-tiques Vet-Kem sont destinés à se compléter les uns

les autres dans un programme global de traitement des puces et des tiques. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire (p. ex., les produits Siphotrol® de Vet-Kem). Ce produit contient Perméthrine et (S)-Méthoprène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent Perméthrine et (S)-Méthoprène après avoir utilisé VET-KEM OviSpot Plus Anti-puces et anti-tiques pour CHIENS DE 14 kg ET PLUS.

**MISES EN GARDE :**

**HUMAINS :**

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif en cas d'ingestion. Porter des gants de caoutchouc lors de l'application. Peut provoquer une irritation des yeux. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après avoir manipulé ou appliqué le produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps étant entré en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Empêcher le produit d'entrer en contact avec les aliments, les ustensiles de cuisine et les endroits où l'on prépare ou conserve la nourriture.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités sont exposés à un risque d'effets nocifs, incluant la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Nocif en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien.

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Wellmark International au 1- 800- 688-7378.

**PREMIERS SOINS :**

**HUMAINS :**

**INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**INHALATION** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin ou un vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE** : Entreposer dans un endroit frais et sec.

**ÉLIMINATION** : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

**AVIS À L'UTILISATEUR** : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Pour en savoir plus, appeler le numéro d'urgence sur les puces et les tiques au 1-800-688-7378 (9 h à 17 h HNE)

® Marques déposées de Wellmark International OviSpot est une marque de commerce de Wellmark International