

2020-3117
2020-08-10

SKEETSAFE Chasse-Moustique en vaporisateur à pompe 30 %-Adulte

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets).

PRINCIPE ACTIF :

DEET plus toluamides apparentés actifs 30%

NO. D'HOM. 28869 LOI P.A.

CONTENU NET: 100 mL – 1Litre

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION



INFLAMMABLE

DenTec Safety Specialists Inc.
195B Harry Walker Parkway North
Newmarket, Ontario L3Y 7B3
1 888 533-6832

2020-3117
2020-08-10

MODE D'EMPLOI : Repousse les moustiques (maringouins) pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser près d'une flamme vive, d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans. ÉVITER tout contact avec le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, les plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide jeter dans les ordures ménagères.