

Advantage™ II Extra Large Dog
Insert (French)

<Elanco Logo>

Advantage^{MC} II chien de très grande taille

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces et adulticide contre les poux

Pour chiens de 7 semaines et plus, pesant plus de 25 kg

Traitement topique mensuel contre les puces et les poux

Liquide

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR USAGE SUR LES CHIENS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 9,1 %, pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 27584 L. P. A.

CONTENU : Un à six tubes de 4,0 mL

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9
1-800-265-5475

43 **Avantage II chien de très grande taille** protège contre les puces et les poux. Il tue, en
44 deçà d'une journée du traitement, de 98 à 100 % des puces ayant infesté les chiens. Le
45 produit peut protéger l'animal contre une réinfestation pour une période allant jusqu'à
46 quatre semaines. Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement
47 réinfesté ou si une action préventive contre les puces est désirée. Les puces, les œufs
48 et les larves sont tués après contact avec les débris cutanés d'un animal traité avec
49 **Avantage II chien de très grande taille**. Le produit offre une protection contre les puces
50 à divers stades de vie en interrompant efficacement tous les stades de vie des puces
51 afin de décimer rapidement et de façon durable les populations d'insectes. **Avantage II**
52 **chien de très grande taille** traite les infestations de poux pour les chiens.

53
54 Ne pas faire de shampoing ni immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le
55 traitement. L'animal peut recevoir un shampoing, être immergé dans l'eau ou être
56 exposé à la pluie trois jours après le traitement. **Avantage II chien de très grande taille**
57 conserve ses propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines après un
58 shampoing, une baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être
59 réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie.
60 Une application supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles
61 activités.

62
63 L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut
64 provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite
65 allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec **Avantage II chien de très**
66 **grande taille** tue rapidement les puces et diminue l'incidence de cette dermatite. Pour
67 une élimination efficace des puces et des poux, le traitement de l'animal devrait être
68 accompagné du nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente. Passer l'aspirateur sur
69 les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où
70 l'animal se couche et vit, ou qu'il fréquente. Si le problème persiste, il faudra peut-être
71 effectuer un traitement insecticide des lieux. Consulter le médecin vétérinaire si
72 l'infestation persiste.

73
74 **MISES EN GARDE:**
75 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré
76 ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. Ne pas mettre dans les yeux.
77 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au
78 moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se
79 laver les mains (et toute autre partie du corps ayant été en contact avec le produit) avec
80 de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.

81
82 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de
83 7 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent se trouver
84 à proximité de l'animal traité. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de
85 compagnie peut, dans de rares cas, produire une sensibilité individuelle. Les animaux

86 plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si
87 les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

88

89 PREMIERS SOINS :

90 ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières
91 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le
92 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
93 l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
94 traitement.

95 EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement
96 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées
97 si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le
98 conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une
99 personne inconsciente.

100 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les
101 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20
102 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
103 traitement.

104

105 ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner
106 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les
107 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.
108 Emporter l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
109 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

110

111 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

112

113 ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le
114 bouchon dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.

115

116 MODE D'EMPLOI :

117 Ce produit contient imidaclopride et pyriproxifène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres
118 produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui
119 contiennent imidaclopride ou pyriproxifène après avoir utilisé Advantage II chien de très
120 grande taille.

121 NE PAS administrer par voie orale. Pour chiens de 7 semaines et plus, pesant plus de
122 25 kg. Ce produit se présente sous forme d'un tube applicateur à dose unique. Cet
123 emballage contient une à six doses mensuelles de 4,0 mL. Traiter le chien une fois par

124 mois selon la façon décrite cidessous. N'appliquer qu'une seule dose de 4,0 mL à la
125 fois. Consulter un médecin vétérinaire avant d'utiliser chez un animal malade, âgé, en
126 gestation, qui allaite ou reçoit un traitement médical ou pesticide. Un médecin
127 vétérinaire devrait être consulté si l'infestation de l'animal par les puces persiste. Un
128 traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si on
129 désire une action préventive contre les puces.
130
131 Pour usage sur les chiens seulement. Ne pas utiliser sur d'autres animaux.
132 Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines.
133 Retirer un applicateur de l'emballage.
134 Tenir le tube en position verticale, ouverture vers le haut. Retirer le bouchon du tube.
135 Retourner le bouchon et le placer en position inversée au bout du tube.
136 Tourner le bouchon afin de briser le sceau du tube, puis retirer le bouchon du tube.
137 Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Le contenu entier du tube
138 d'Advantage II chien de très grande taille devrait être appliqué de façon égale, en 6 à 8
139 endroits, sur le dos, en partant des omoplates jusqu'à la base de la queue. À chaque
140 point, écarter le pelage du dos du chien, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la
141 pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à y appliquer une portion de
142 solution. Ne pas appliquer une quantité excessive de solution en un endroit, car elle
143 pourrait couler sur les côtés du chien. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou
144 la gueule de l'animal. Tenir l'animal éloigné des meubles et des planchers de bois
145 francs jusqu'à ce qu'Advantage II chien de très grande taille soit sec.
146
147 Jeter le tube vide de la manière décrite à la section « ÉLIMINATION ».
148 GARDER LE FEUILLET D'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
149
150 Advantage, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou
151 de ses sociétés affiliées. ©2022 Elanco ou ses sociétés affiliées.
152

2022-0231
2022-01-31

153
154
155 <Elanco Logo>

Advantage™ II Extra Large Dog
Carton (French)

Advantage^{MC} II chien de très grande taille

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces et adulticide contre les poux

Pour chiens de 7 semaines et plus, pesant plus de 25 kg

Traitement topique mensuel contre les puces et les poux

Liquide

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR USAGE SUR LES CHIENS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 9,1 %, pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 27584 L. P. A.

CONTENU : Un à six tubes de 4,0 mL

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9
1-800-265-5475

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

195 Advantage II chien de très grande taille protège contre les puces et les poux. Il tue, en
196 deçà d'une journée du traitement, de 98 à 100 % des puces ayant infesté les chiens. Le
197 produit peut protéger l'animal contre une réinfestation pour une période allant jusqu'à
198 quatre semaines. Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement
199 réinfesté ou si une action préventive contre les puces est désirée. Les puces, les œufs
200 et les larves sont tués après contact avec les débris cutanés d'un animal traité avec
201 Advantage II chien de très grande taille. Le produit offre une protection contre les puces
202 à divers stades de vie en interrompant efficacement tous les stades de vie des puces
203 afin de décimer rapidement et de façon durable les populations d'insectes. Advantage II
204 chien de très grande taille traite les infestations de poux pour les chiens.

205
206 Ne pas faire de shampooing ni immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le
207 traitement. L'animal peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou être
208 exposé à la pluie trois jours après le traitement. Advantage II chien de très grande taille
209 conserve ses propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines après un
210 shampooing, une baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être
211 réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie.
212 Une application supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles
213 activités.

214
215 **MISES EN GARDE :**

216 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré
217 ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux.
218 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au
219 moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se
220 laver les mains (et toute autre partie du corps ayant été en contact avec le produit) avec
221 de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.

222
223 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de
224 7 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent se trouver
225 à proximité de l'animal traité. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de
226 compagnie peut, dans de rares cas, produire une sensibilité individuelle. Les animaux
227 plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si
228 les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.

229
Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

230

231 **PREMIERS SOINS :**

2022-0231

2022-01-31

232 **ÉTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières
233 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le
234 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
235 l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
236 traitement.

237 **EN CAS D'INGESTION**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement
238 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées
239 si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le
240 conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une
241 personne inconsciente.

242 **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les
243 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20
244 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
245 traitement.

246
247 **ANIMAUX DE COMPAGNIE** : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner
248 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les
249 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

250 Emporter l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
251 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

252
253 **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter le patient selon les symptômes.

254
255 **ÉLIMINATION** : Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et jeter
256 avec les ordures ménagères.

257

2022-0231
2022-01-31

258
259
260 <Elanco Logo>

Advantage™ II Extra Large Dog
Tube (French)

Advantage^{MC} II chien de très grande taille

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 9,1 %, pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 27584 L. P. A.

Elanco Canada Limited
Mississauga, Ontario L5N 0C9

4,0 mL