

UN EXTERMINATEUR EN BOUTEILLE

SUREKILLER

POUDRE INSECTICIDE

DOMESTIQUE

GARANTIE : ACIDE BORIQUE 80%

140g

NE TACHE PAS

SANS ODEUR

NO. D'HOMOL. 26872 LOI P.A.

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

SUREKILLER PRODUCTS LIMITED

1285 ST. MARYS AVE

MISSISSAUGA, ONTARIO

L5E 1H8

905-271-2711

LE SUREKILLER tue les blattes, fourmis et lépismes argentés si utilisé selon le mode d'emploi.

MODE D'EMPLOI : Saupoudrer librement une quantité de poudre aux endroits où les blattes, fourmis, et lépismes argentés se retrouvent incluant derrière ou en dessous des machines à laver, des tuyaux d'eau chaude, des éviers de cuisine et des poubelles, en une fine couche au-dessus des surfaces, dans les fissures et les crevasses. Les insectes prennent environ 10 jours à mourir. Répéter au besoin. Ne pas enlever la poudre jusqu'à ce que tous les insectes aient disparu. Bien fermer le contenant après l'usage et l'entreposer dans un endroit frais et sec.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Nocif si avalé. Éviter de respirer la poussière. Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants, ne pas utiliser dans les armoires à nourriture ou d'autres endroits où la nourriture, les ustensiles ou les boissons peuvent être contaminés. Ne pas déverser ou vider la poudre sur les racines ou les plantes de valeur.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )