

MEGA INSECT KILLER SPOT TREATMENT

DOMESTIQUE

NO. D'ENR 27510 . Loi P.A.

GARANTIE

D-trans Alléthrine	0.054%
Permétrine	0.218%
N'octyl Bicycloheptene Dicarboximide	0.251%

Contenu net 320g

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

TENIRS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NPI-BUGCON - 5 Mackenzie Ave, Unit 9. Ajax, ON L1S 2G2

necticide Résiduel de Contact en Vaporisateur sous Pression

Tue les fourmis par action résiduelle, perce-oreilles, puces, pollénies du lombric, mouche domestiques, cloportes, araignées, Lépismes argentés, Anthrènes des tapis, Blattes, Grillons, Tiques sanguines, Millipèdes, et autres insectes listés dans la maison.

Les mouches et les moustiques venant se reposer sur les surfaces traitées seront tués.

MODE D'EMPLOI:

GÉNÉRAL:

SECOUER AVANT D'UTILISER. MAINTENIR LE RÉCIPIENT VERTICALEMENT APPLIQUER EN PETITES BOUFFÉES. Utiliser le vaporisateur contre les insectes rampants, comme traitement localisé ou traitement de fissure et crevasse pour limiter les fourmis, les blattes, les tiques sanguines, les puces, les Pollénies du lombric, les mouche domestiques, les cloportes, communs les araignées, les lépismes argentés, les anthrènes des tapis, les grillons, les millipèdes et autres insectes dont la liste figure ci-dessous. Ne pas appliquer ce vaporisateur que comme un vaporisateur brut ou comme traitement des fissures crevasses dans les zones localisées où l'on trouve des parasites où là pourraient apparaître. Vaporiser les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient humides. Répéter selon le besoin.

POUR UN TRAITEMENT LOCALISÉ: Pour tuer les fourmis, les blattes, les grillons, les lépismes argentés, les araignées, les cloportes, les perce-oreilles et les anthrènes des tapis: Vaporiser les zones où l'on trouve ces parasites et où ils peuvent se cacher, comprenant les coins sombres de pièces et de placards; les fissures et les crevasses dans les murs; le long des plinthes et des cadres de portes et de fenêtres; derrière et en-dessous des éviers, des cuisinières, des réfrigérateurs et des placards et autour des poubelles, de la plomberie et d'autres installations utilitaires. Les parasites qui sont expulsés de leurs cachettes devaient être vaporisés directement. Pour les fourmis, appliquer sur les chemins empruntés par les fourmis, ainsi qu'autour des portes et des fenêtres et partout où ces parasites pourraient pénétrer. Répéter si nécessaire.

Pour tuer les tiques sanguines et les puces:

Appliquer à fond comme traitement localisé sur les zones infestées, telles que les litières et les lieux de repos des animaux de compagnie, les fissures et les crevasses à proximité, le long et derrière les plinthes, les cadres de porte et de fenêtre et des zones localisées sur le sol et les

revêtements de sol où ces parasites pourraient être présents. Il faudrait enlever les anciennes litières et les remplacer par des litières propres et fraîches après le traitement. **NE PAS TRAITER LES ANIMAUX DE COMPAGNIE AVEC CE PRODUIT.**

Mouches et moustiques:

Ne pas utiliser qu'en plein air comme aide pour réduire la gêne apportée par ces parasites. Vaporiser les surfaces extérieures des cadres de porte et de fenêtre de même que les autres zones par où ces parasites peuvent pénétrer dans la maison. Vaporiser également les coins sombres et les zones de repos et garages où ces insectes peuvent se rassembler. Les mouches et les moustiques venant se reposer sur les surfaces traitées seront tués. Répéter le traitement si nécessaire.

POUR LES FISSURES ET LES CREVASSES:

Pur tuer les fourmis, les blattes, les grillons, les lépismes argentés, les cloportes, communs, les araignées, les perce-oreilles, les tiques sanguines, les mouches, et les anthrènes des tapis:

Vaporiser en petites quantités directement dans les fissures et les crevasses. Il faut prendre soin d'éviter de mettre du produit sur les surfaces exposés ou de vaporiser du produit dans l'air.

Éviter de contaminer des aliments ou des surfaces de traitement des aliment. **ENTREPOSAGE:**

Entreposer dans une zone froide à l'écart de chaleur ou d'une flamme découverte.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau ou par les vêtements. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. **NE PAS UTILISER SUR LES ÊTRES HUMAINS, LES PLANTES, LES ANIMAUX, LES PRODUITS ALIMENTAIRES, LES USTENSILES, OU LES BOCAUX à POISSON OU LES ZONES DE NOURRITURE D'ANIMAUX. NE PAS UTILISER COMME VAPORISATEUR AMBIANT.** Ne pas utiliser dans toute zone où l'on manipule, prépare ou entrepose de la nourriture. Contenu sous pressions. Ne pas incinérer ou perforer le contenant. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas utiliser près d'une flamme ouverte. Ne pas fumer au cours de l'emploi. Ne pas vaporiser dans les yeux. Nocif si avalé, respirer ou absorber par la peau. Éviter de respirer la brume de vaporisation et utiliser avec une bonne ventilation. Dans les maisons ou résidences, enlever ou couvrir la nourriture et les utensiles avant de vaporiser. Ne pas utiliser ce produit sur des récoltes pour consommation humaine ou animale ou dans des endroits qui sont directement reliés au traitement des denrées alimentaires. Enlever les animaux de compagnie, oiseaux, et couvrir les bocal à poissons avant de vaporiser. Ce produit antiparasitaire est toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement à un bassin d'eau. Ne pas contaminer l'eau.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le récipient est vide, appuyer sur la valve pour libérer toute pression et jeter ensuite avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))