

2024-2967
2024-07-18

King

ECO-WAY PTV Fongicide à pulvériser pour Pomme de terre, Tomate et Légumes

Poudre mouillable

Pour la suppression de l'anthracnose, des brûlures, des taches foliaires, du mildiou et des moisissures sur les fruits, les légumes et les plantes ornementales.

DOMESTIQUE

No D'HOM. 29968 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF : Cuivre provenant de sulfate de cuivre tribasique 53%

AVERTISSEMENT

(symbole)

POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 500g

King Home & Garden Inc.
577 Industrial Drive
Fort Erie, Ontario, L2A 5M4
Canada
1-866-458-5464 [www. Kinghg.on.ca](http://www.Kinghg.on.ca)

MODE D'EMPLOI: King Eco-Way PTV fongicide à pulvériser pour pomme de terre, tomate et légumes est une poudre mouillable dans l'eau, à suspension améliorée qu'on utilise sous forme de pulvérisation pour supprimer certaines maladies des plantes. Mélanger parfaitement la poudre dans l'eau de la manière indiquée ci-dessous, puis garder le mélange bien agité durant la pulvérisation. Bien mouiller toutes les feuilles et les tiges. Ce produit peut être appliqué (à l'aide d'un pulvérisateur pour plantes et arbres à l'extrémité d'un boyau d'arrosage, ou bien avec un pulvérisateur à réservoir à air comprimé) jusqu'à une (1) journée avant la récolte. Peut tacher la peinture, la pierre ou la brique. **NE PAS** appliquer ce produit quand il peut entrer en contact avec adultes, enfants ou animaux de compagnie, soit directement ou par la dérive. **NE PAS** contaminer l'eau d'irrigation ou l'eau potable ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. **NE PAS** appliquer à aucun plan d'eau. Éviter l'application de ce produit dans un temps venteux.

Pommes: Mélanger 60ml (4 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Appliquer à la mi-juillet et immédiatement après la cuillette. **Betteraves et Carottes:** Mélanger 60ml (4 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Appliquer le produit conformément aux recommandations du calendrier provincial des pulvérisations ou dès l'apparition des avaries causées par la maladie, puis répéter le traitement à des intervalles de 7 à 10 jours ou selon le besoin pour la suppression des maladies. **Brocolis, Choux, Choux Fleurs:** Mélanger 60ml (4 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Pulvériser ce mélange dès l'apparition de la maladie. **Céleri, Aubergines, Piments, Pommes de Terre, Tomates:** Mélanger 60ml (4 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Appliquer ce mélange lorsque les plantes ont de 12 à 18cm de hauteur et répéter le traitement tous les 7 à 10 jours. **Concombres, Melons, Citrouilles, Courges:** Mélanger 45ml (3 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Commencer le traitement lorsque les plantes commencent à ramper et le répéter à des intervalles de 7 jours par temps humide, et de 10 jours par temps sec. **Raisins:** Mélanger 45ml (3 cuillerées à soupe) et 60g de chaux hydratée (en vente dans les magasins de matériaux de construction) dans 10L d'eau. Pulvériser ce mélange avant l'éclosion des fleurs. Répéter le traitement après la floraison et à des intervalles de 10 à 12 jours. Ne pas employer sur les vignes hybrides françaises ni sur les variétés vinifera. **Pêches:** Mélanger 60ml (4 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Arrosage de dormance, particulièrement vers la fin de l'automne. Ne jamais l'utiliser quand les pêchers sont en feuilles. **Fraises:** Mélanger 45ml (3 cuillerées à soupe) dans 10L d'eau. Effectuer une pulvérisation 1 mois après leur mise en terre, puis 2 autres fois à des intervalles de 10 jours. (Vérifier les recommandations du calendrier local des pulvérisations).

Note: 15ml (1 cuillerée à soupe rase) de King Eco-Way fongicide à pulvériser pèsent 10 g

RÉCOLTES	MALADIES	Nombre maximal d'applications par année	Intervalle minimal par application (jour) ²	Taux max. par application, en gramme, de produit par 10m ²
Pommes	Anthracnose	2	10	3
Raisins	Mildiou, Pourriture noire, Excoriose	7	3	5,7

Pêches	Anthracnose, brûlure corynéenne, cloque, criblure	2	7	1,9
Fraises	Tache des feuilles	5	7	3,8
Betteraves,	Cercosporiose	6	7	4,0
Carottes		5		
Brocoli, Choux, Choux-fleurs	Mildiou	5	7	4,0
Céleri	Brûlure hâtive ou tardive, Anthracnose, Moisissure des feuilles, Septoriose	5	5	3,8
Aubergines, Piments,		10	3	4,0
Pommes de terre		5	3,8	
Tomates		3	4,5	
Concombres,	Tache angulaire, Anthracnose, Mildiou, Gale	5	7	3,8
Melons, Citrouilles, Courges			5	3,0

²: Nombre minimal de jours entre chaque application.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Entreposer ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré. Peut irriter les yeux, le nez, la gorge ainsi que tacher la peau. Éviter tout contact du produit avec ces organes et avec les vêtements et éviter d'en respirer la poussière ou la bruine pulvérisée. Ne pas contaminer la nourriture pour humains ou pour animaux ou les plans d'eau. Bien se laver après chaque utilisation et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, utiliser du tabac ou les toilettes. **NE PAS** permettre aux adultes, enfants ou animaux de compagnie d'entrer les lieux traités jusqu'à ce que le produit soit séché.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX: Ne pas appliquer ce produit directement dans les habitats aquatiques (comme des lacs, des rivières, des brouillards, des étangs, des coulées, des fondrières des Prairies, des criques, des marais, des cours d'eau, des réservoirs et des milieux humides), les habitats estuariens ou les habitats marins. Toxique pour les oiseaux, les petits mammifères sauvages, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non-ciblés. Afin de réduire le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des zones traitées, éviter d'appliquer ce produit sur des pentes modérées ou abruptes et sur des sols compactés ou argileux. Le risque de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre la zone traitée et le plan d'eau. Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer

L'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION , appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.