

## Protecteur de gazon professionnel Ed

(inhibiteur de germination de graines de mauvaises herbes de prélevée qui contient de la farine de gluten de maïs) pour empêcher la germination des graines de digitale sanguine, du trèfle blanc et du pissenlit dans les endroits publics, comme les terrains de sport, les parcs, les terrains de golf et les gazonnières où l'espèce herbacée prédominante est l'ivraie vivace établie ou le pâturin des prés établi.

### COMMERCIAL

#### LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : farine de gluten de maïs 100%

No. D'ENR 28653 DE LA LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT : IRRITANT OCULAIRE ALLERGÈNE POTENTIEL

CONTENU : 20 kg

Ed's Purely Organic Lawn and Garden Products Ltd.

101, chemin Duncan Mill, bureau 400

Toronto, Ontario

M3B 1Z3

1 800 777-LAWN (5296)

Le protecteur de gazon professionnel Ed empêche la germination des graines de la digitale sanguine, du trèfle blanc et de pissenlit sur les pelouses résidentielles où l'espèce herbacée prédominante est l'ivraie vivace établie ou le pâturin des prés établi.

#### Dose :

##### APPLICATION AU PRINTEMPS :

Appliquez sur une pelouse où l'on retrouve de l'ivraie vivace établie ou du pâturin des prés établi tôt au printemps. Attendez deux semaines entre les applications et avant la germination des graines de mauvaises herbes à un taux d'application de 9,7 kg/100 m<sup>2</sup> (20 lb /1 000 pi<sup>2</sup>).

##### APPLICATION TARD EN ÉTÉ OU TÔT À L'AUTOMNE :

Appliquez sur une pelouse où l'on retrouve l'ivraie vivace établie ou du pâturin des prés établi tard en été ou tôt à l'automne après les chaleurs de l'été à un taux d'application de 9,7 kg/100 m<sup>2</sup> (20 lb /1 000 pi<sup>2</sup>).

#### Mode d'emploi :

1. Mesurez l'étendue sur laquelle appliquer l'herbicide en multipliant la longueur par la largeur de l'étendue totale en mètres. Une mesure de pas normal est environ un mètre. Mesurez les bâtiments, la piscine ou l'entrée de cour de la même façon et soustrayez la valeur obtenue de l'étendue totale. Le total restant représente l'étendue recouverte de gazon à traiter.

2. Appliquez le protecteur de gazon professionnel Ed's Purely Organic<sup>MC</sup> (inhibiteur de germination de graines de mauvaises herbes de prélevée) à l'aide d'une épandeuse rotative pour les grandes surfaces. Pour de plus petites surfaces, appliquez le protecteur de gazon professionnel Ed's Purely Organic<sup>MC</sup> (inhibiteur de germination de graines de mauvaises herbes de prélevée) à l'aide d'une petite épandeuse à main.

3. Appliquez le protecteur de gazon professionnel Ed's Purely Organic<sup>MC</sup> (inhibiteur de germination de graines de mauvaises herbes de prélevée) en motif entrecroisé. Utilisez la moitié de la dose dans chaque direction. Appliquez lorsque le sol est humide et que de la pluie est prévue dans les deux jours suivant le traitement. S'il n'y a aucune précipitation dans les deux jours du traitement, le terrain doit être arrosé. Une humidité excessive au moment du traitement peut réduire l'efficacité du produit.

---

Le protecteur de gazon professionnel Ed's Purely Organic<sup>MC</sup> ne doit pas être appliqué sur du gazon nouvellement ensemencé avant la première tonte lorsque les réseaux radiculaires sont établis, puisque le produit empêche les graines de germer. Pour obtenir de meilleurs résultats : Appliquez sur une pelouse où l'on retrouve de l'ivraie vivace établie ou du pâturin des prés établi deux fois l'an; une fois tôt au printemps et à nouveau tard à l'été ou tôt à l'automne.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Peut causer une sensibilisation. Le protecteur de gazon professionnel Ed's Purely Organic<sup>MC</sup> (inhibiteur de germination de graines de mauvaises herbes de prélevée) ne devrait pas être appliqué si un membre de la résidence est sensible ou allergique au maïs.

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Éviter l'inhalation des poussières.

Ne pas appliquer le produit par temps venteux

Par mesure d'hygiène, portez une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures fermées et des gants lors de la manipulation du produit. De plus, il est recommandé de porter un masque antipoussières lorsque vous transvidez le produit dans l'épandeuse.

**REMARQUE :** n'appliquez pas le produit sur du gazon nouvellement ensemencé car cela pourrait empêcher les graines de germer, attendez jusqu'après la première tonte lorsque les réseaux radiculaires sont établis. N'appliquez pas ce produit si vous êtes allergique au maïs. N'appliquez pas ce produit au printemps, si vous procédez au sursemis ou au gazonnement pendant cette période. N'appliquez pas ce produit à l'automne, si vous procédez au sursemis ou au gazonnement pendant cette période.

#### **PREMIERS SOINS :**

##### **EN CAS D'INGESTION :**

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

##### **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :**

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**GÉNÉRAL :** obtenez de l'aide médicale si vous remarquez de l'irritation ou si des signes de toxicité apparaissent et se persistent ou si ces signes sont graves. Emporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**ENTREPOSAGE:** gardez le produit dans un milieu frais et sec, loin des graines, des fertilisants et d'autres pesticides.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique

#### **ÉLIMINATION :**

- 1. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.**
- 2. Rendre le contenant inutilisable.**
- 4. Pour tout renseignements concernant l'élimination des produits non inutilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.**

#### **AVIS À L'UTILISATEUR :**

**Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.**

**L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.**

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.