

K9 Advantix™ 55
Insert (French)

<Elanco Logo>

K9 Advantix^{MC} 55

Adulticide contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Traitement topique mensuel contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Liquide

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS PESANT ENTRE 11 et 25 kg

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 8,8 %
Perméthrine à 44 %

N° D'HOM. 27660 L.P.A.

CONTENU NET: Un à six tubes de 2,5 mL

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9
1-800-265-5475

45
46 K9 Advantix 55 Adulticide contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux
47 contrôlera les puces, les tiques, et les poux présents sur le chien en moins d'un jour
48 après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les réinfestations durant au
49 moins quatre semaines. K9 Advantix 55 Adulticide contre les puces, les tiques, les
50 moustiques et les poux aussi tue les moustiques. D'autres infestations causées par
51 l'apparition de nouveaux parasites dans l'environnement peuvent continuer à se
52 produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les
53 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant
54 d'infestation ou si une action préventive contre les puces, et les tiques est désirée.

55
56 Pour une élimination efficace des puces, des tiques, et des poux, le traitement de
57 l'animal devrait être accompagné d'un nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente.
58 Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage)
59 et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux voisins. Si le
60 problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des
61 lieux.

62
63 Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection contre les
64 puces et les poux; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la
65 suite d'un shampoing.

66
67 L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut
68 provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite
69 allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec K9 Advantix 55 Adulticide
70 contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux tue rapidement les puces et
71 peut diminuer l'incidence de cette dermatite.

72 Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

73

74 **MISES EN GARDE :**

75

76 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré
77 ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux.
78 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter tout contact avec l'animal tant
79 que le produit n'est pas sec.

80 Porter des gants en caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la
81 manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du
82 corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Ce produit
83 est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée
84 aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

85

86 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou
87 qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités risquent de graves
88 lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut
89 produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des
90 effets indésirables. Surveiller de près.

91 Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles
92 gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide.
93 Ne pas utiliser sur des animaux de moins de 8 semaines..
94

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

95
96 **PREMIERS SOINS :**
97 **ÊTRES HUMAINS :** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et
98 rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant,
99 retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler
100 un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
101 traitement.

102 En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
103 obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la
104 personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu
105 le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à
106 une personne inconsciente.

107 En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements
108 contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.
109 Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils
110 sur le traitement.

111 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
112 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

113
114 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en
115 ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de
116 sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

117
118 **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter le patient selon les symptômes.

119
120 **ÉLIMINATION :** Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter
121 aux ordures ménagères.

122
123 **MODE D'EMPLOI :**
124 Ce produit contient imidaclopride et perméthrine. Ne pas traiter l'animal avec d'autres
125 produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui
126 contiennent imidaclopride ou perméthrine après avoir utilisé K9 Advantix 55 Adulticide
127 contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux.

128 • **NE PAS** administrer par la gueule. Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins
129 de 8 semaines.

130 • Consulter un vétérinaire si l'infestation persiste.

- 131 • Ne pas utiliser sur les chats ou chatons. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser
132 sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des
133 animaux recevant un traitement médical ou pesticide.
- 134 • N'utiliser que sur les chiens pesant entre 11 et 25 kg.
- 135 • Ce produit est emballé dans des tubes à dose unique. Cet emballage contient un
136 à six doses mensuelles de 2,5 mL. Traiter votre chien mensuellement de la façon
137 décrite ci-dessous. Ne pas appliquer une dose supérieure à un tube de 2,5 mL à
138 la fois.
- 139 • Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou
140 si on désire une action préventive contre les puces et les tiques.
- 141 • Retirer un applicateur de l'emballage.
- 142 • Tenir le tube-applicateur en position verticale, le capuchon vers le haut. Retirer le
143 capuchon du tube.
- 144 • Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur le tube.
- 145 • Tourner le capuchon pour briser le sceau, puis retirer le capuchon du tube.
- 146 • Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Appliquer uniformément tout
147 le contenu du tube de K9 Advantix 55 Adulticide contre les puces, les tiques, les
148 moustiques et les poux à quatre ou cinq endroits sur le dessus du dos, entre les
149 épaules et la base de la queue. À chaque endroit, écarter les poils jusqu'à ce
150 que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et presser
151 doucement pour appliquer une certaine quantité de solution sur la peau. Ne pas
152 appliquer une quantité excessive de solution en un seul endroit de façon à éviter
153 que la solution coule le long des flancs de l'animal. Éviter tout contact de ce
154 produit avec les yeux ou la gueule de votre animal de compagnie.
- 155 • Jeter le tube vide, tel que décrit à la section « ÉLIMINATION ».

156
157 Elanco Canada Limited
158 1919 Minnesota Court, Suite 401
159 Mississauga, Ontario L5N 0C9

160
161 K9 Advantix, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou
162 de ses sociétés affiliées. ©2022 Elanco ou ses sociétés affiliées.

163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

K9 Advantix™ 55
Carton (French)

<Elanco Logo>

K9 Advantix^{MC} 55

Adulticide contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Traitement topique mensuel contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux

Liquide

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS PESANT ENTRE 11 et 25 kg

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 8,8 %
Perméthrine à 44 %

N° D'HOM. 27660 L.P.A.

CONTENU NET: Un à six tubes de 2,5 mL

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9
1-800-265-5475

208 K9 Advantix 55 Adulticide contre les puces, les tiques, les moustiques et les poux
209 contrôlera les puces, les tiques, et les poux présents sur le chien en moins d'un jour
210 après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les réinfestations durant au
211 moins quatre semaines. K9 Advantix 55 Adulticide contre les puces, les tiques, les
212 moustiques et les poux aussi tue les moustiques . D'autres infestations causées par
213 l'apparition de nouveaux parasites dans l'environnement peuvent continuer à se
214 produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les
215 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant
216 d'infestation ou si une action préventive contre les puces, et les tiques est désirée.

217
218 Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection; par
219 conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la suite d'un shampoing.
220 Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

221
222 **MISES EN GARDE :**
223 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si ingéré
224 ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. **NE PAS** mettre dans les yeux.
225 Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter tout contact avec l'animal tant
226 que le produit n'est pas sec. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du
227 produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute
228 autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du
229 savon. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la
230 nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le
231 produit.

232
233 **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou
234 qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités risquent de graves
235 lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut
236 produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des
237 effets indésirables. Surveiller de près.
238 Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles
239 gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide.
240 Ne pas utiliser sur des animaux de moins de 8 semaines.

241
242

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.
--

243
244 **PREMIERS SOINS :**
245
246 **ÊTRES HUMAINS :** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et
247 rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant,

248 retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler
249 un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
250 traitement.

251 En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
252 obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la
253 personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu
254 le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à
255 une personne inconsciente.

256 En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements
257 contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.
258 Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils
259 sur le traitement.

260 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
261 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

262
263 ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en
264 ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de
265 sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

266
267 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

268
269 ÉLIMINATION : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter
270 aux ordures ménagères.

271

2022-0231
2022-01-31

272
273
274
275
276
277
278
279
280

K9 Advantix™ 55
Tube (French)

<Elanco Logo>

K9 Advantix^{MC} 55

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



281
282
283
284
285
286
287
288

AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

N° D'ENR. 27660 L.P.A.