

(Box label)

Primidacide 4.6-11 Kg

Adulticide contre les puces

Pour les chiens âgés de 12 semaines et plus, pesant entre 4,6 kg et 11 kg
[Une fois par mois] Traitement topique [mensuel] contre les puces

LIQUIDE

[Tue les puces rapidement] [Tue rapidement les puces] [et] [peut réduire la dermatite allergique par piquûres de puces (DAPP)]

[Supprime les puces dans les 24 heures suivant le traitement]

[Protection contre les infestations de puces pendant [au moins] quatre (4) semaines [au minimum]

[Approvisionnement de [trois] [quatre] [six] [3] [4] [6] mois]

LIRE L'ÉTIQUETTE [ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE] AVANT L'USAGE
POUR UTILISATION SUR LES CHIENS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT

POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

GARANTIE : imidacloprid 9,1 %

N°. D'HOMOLOGATION 31309 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

[Trois] [Quatre] [Six] [x] tubes de 1,0 mL

TWIST N° USE TUBEMC

[Simple] [et] [facile à ouvrir]

[Bouchon] [Embout] [inviolable] [à ouverture par axe vissable intérieur]

[Tube souple Pharma] [hygiénique] [pour application de dose unique]

[Fusion Animal Health Inc.

71 Main Street

Exeter, Ontario

N0M 1S3

416-627-9425]

Primidacide 4.6-11 Kg contrôlera les puces présentes sur le chien en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations durant au moins 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a un risque constant d'infestation. Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent. Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection contre les puces; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la suite d'un shampoing. Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

[Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être combiné à la désinfection de tous les endroits fréquentés par l'animal. Il est nécessaire de passer l'aspirateur sur les planchers, tapis et meubles (jeter le sac après usage) et de laver les endroits où l'animal se couche, vit ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

L'alimentation répétitive des puces sur les animaux de compagnie peut amener un trouble d'hypersensibilité dermique : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement des animaux avec Primidacide 4.6-11 Kg tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette condition.

Primidacide 4.6-11 Kg est sécuritaire lorsqu'il est utilisé de pair avec les produits vétérinaires d'emploi courant. Consulter votre vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux sous médication.

MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient imidacloprid. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampoings, des poudres ou des colliers qui contiennent imidacloprid après avoir utilisé Primidacide 4.6-11 kg. Ne PAS administrer par la gueule. Ne PAS utiliser sur d'autres animaux. Consulter un vétérinaire avant utilisation sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux sous médication ou traités avec d'autres pesticides. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

Ne pas utiliser sur les chiots âgés de moins de 12 semaines.

Utiliser uniquement sur les chiens pesant entre 4,6 kg et 11 kg.

Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage contient [Trois] [Quatre] [Six] [3] [4] [6] doses mensuelles de 1,0 mL. Utiliser sur le chien de la manière décrite ci-dessous.

Ne pas utiliser une dose supérieure à un tube de 1,0 mL à la fois.

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut.

Tourner la pointe bouchon afin de briser le sceau du tube.

Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Le contenu entier du tube de Primidacide 4.6-11 Kg devrait être appliqué de façon égale entre deux et trois points sur le dessus du dos, en partant des omoplates jusqu'à la base de la queue. À chaque point, écarter le pelage du dos du chien jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et le presser de façon à y appliquer une portion de solution. Ne pas appliquer une quantité excessive de solution en un endroit ce qui pourrait lui permettre de couler sur les côtés du chien. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Tenez votre animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce que Primidacide 4.6-11 Kg sèche.

Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.]

PRÉCAUTIONS :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit.

Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 12 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Fusion Animal Health Inc. au 1-800-265-9754.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

[GARDER L'INFORMATION DE L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.]

[Fusion Animal Health Inc.
71 Main Street
Exeter, Ontario
N0M 1S3
416-627-9425]

(Insert label)

Primidacide 4.6-11 Kg

Adulticide contre les puces

Pour les chiens âgés de 12 semaines et plus, pesant entre 4,6 kg et 11 kg

[Une fois par mois] Traitement topique [mensuel] contre les puces

LIQUIDE

[Tue les puces rapidement] [Tue rapidement les puces] [et] [peut réduire la dermatite allergique par piquûres de puces (DAPP)]

[Supprime les puces dans les 24 heures suivant le traitement]

[Protection contre les infestations de puces pendant [au moins] quatre (4) semaines [au minimum]

[Approvisionnement de [trois] [quatre] [six] [3] [4] [6] mois]

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE

POUR UTILISATION SUR LES CHIENS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT

POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

GARANTIE : imidacloprid 9,1 %

N°. D'HOM. 31309 L.P.A.

[Trois] [Quatre] [Six] tubes de 1,0 mL

[TWIST N' USE TUBE_{MC}]

[Simple] [et] [facile à ouvrir]

[Bouchon] [Embout] [inviolable] [à ouverture par axe vissable intérieur]

[Tube souple Pharma] [hygiénique] [pour application de dose unique]

Primidacide 4.6-11 Kg contrôlera les puces présentes sur le chien en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations durant au moins 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a un risque constant d'infestation. Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent. Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection contre les puces; par conséquent, une nouvelle application peut être nécessaire à la suite d'un shampoing. Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être combiné à la désinfection de tous les endroits fréquentés par l'animal. Il est nécessaire de passer l'aspirateur sur les planchers, tapis et meubles (jeter le sac après usage) et de laver les endroits où l'animal se couche, vit ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

L'alimentation répétitive des puces sur les animaux de compagnie peut amener un trouble d'hypersensibilité dermique : la dermatite allergique aux piquûres de puces (DAPP). Le traitement des animaux Primidacide 4.6-11 Kg tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette condition.

Primidacide 4.6-11 Kg est sécuritaire lorsqu'il est utilisé de pair avec les produits vétérinaires d'emploi courant. Consulter votre vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux sous médication. Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

PRÉCAUTIONS :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 12 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Effets secondaires : Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Fusion Animal Health Inc. au 1-800-265-9754.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements

contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient imidacloprid. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent imidacloprid après avoir utilisé Primidacide 4.6-11 kg. Ne PAS administrer par la gueule. Ne PAS utiliser sur d'autres animaux. Consulter un vétérinaire avant utilisation sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux sous médication ou traités avec d'autres pesticides. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

Ne pas utiliser sur les chiots âgés de moins de 12 semaines.

Utiliser uniquement sur les chiens pesant entre 4,6 kg et 11 kg.

Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage contient [Trois] [Quatre] [Six] [3] [4] [6] doses mensuelles de 1,0 mL. Utiliser sur le chien de la manière décrite ci-dessous.

Ne pas utiliser une dose supérieure à un tube de 1,0 mL à la fois.

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut.

Tourner la pointe bouchon afin de briser le sceau du tube.

Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Le contenu entier du tube de Primidacide 4.6-11 Kg devrait être appliqué de façon égale entre deux et trois points sur le dessus du dos, en partant des omoplates jusqu'à la base de la queue. À chaque point, écartez le pelage du dos du chien jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et le presser de façon à y appliquer une portion de solution. Ne pas appliquer une quantité excessive de solution en un endroit ce qui pourrait lui permettre de couler sur les côtés du chien. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Tenez votre animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce que Primidacide 4.6-11 Kg sèche.

Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

GARDER L'INFORMATION DE L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Fusion Animal Health Inc.

71 Main Street

Exeter, Ontario

N0M 1S3

416-627-9425

(Tube label)

Primidacide 4.6-11 Kg

LIRE L'ÉTIQUETTE [ET][&] [LE] FEUILLET D'EMBALLAGE] AVANT L'USAGE

AVERTISSEMENT

POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

[GARANTIE :]imidacloprid 9,1 %

N° D'HOM 31309 LPA

[Fusion Animal Health Inc.

71 Main Street

Exeter, Ontario

N0M 1S3]

[Fusion Animal Health]

416-627-9425

1,0 mL