

2019-7137
2020-07-30

Doktor Doom puissance maximale éliminateur de punaises des lits sous forme de
barrière rémanente

Insecticide de contact à effet rémanent sous pression

DOMESTIQUE

Ce produit doit être utilisé pour tuer les punaises des lits à l'intérieur des bâtiments

PRINCIP ACTIF: Perméthrine...0,25 %

No D'HOMOL. 30873 L.P.A.

CONTENU NET : 75-775 grammes

ATTENTION EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

753146 AB Ltd. o/a UltraSol Industries Limited*
10755-69, Avenue
Edmonton (Alberta) Canada
T6H 2C9
1-780-432-6535

*Société appartenant entièrement à des intérêts canadiens et exploitée par des Canadiens

2019-7137
2020-07-30

MODE D'EMPLOI :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés.

Ce produit est prêt à l'emploi. BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Ce contenant possède une valve spéciale qui permet de pulvériser le produit dans toutes les directions, même à l'envers, sur les endroits difficiles à atteindre lors des traitements dans les fentes et fissures.

Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l'organisme nuisible ciblé, dans la mesure du possible.

Les surfaces de ciment non-peintes ou non-scellées requerront peut-être une autre application après une semaine si nécessaire.

Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation.

RESTRICTIONS :

- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- Sauf indication contraire sur cette étiquette, NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.
- NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires).
- Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.
- Cet insecticide peut tacher ou endommager certains matériaux à base de plastique, de caoutchouc ou d'asphalte tels que les carreaux, les couvre-planchers et les tapis. Appliquer prudemment sur les surfaces indiquées, en évitant tout mouillage excessif.

2019-7137
2020-07-30

- Ne pas utiliser sur les tentures, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher. Ne pas utiliser sur les rideaux, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher.
- Pour toute autre surface, traiter une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches avant de procéder à l'application complète.

COMMENT APPLIQUER :

NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE NI DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ. Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter, puis pulvériser le produit pour bien mouiller la surface mais pas jusqu'au ruissellement. Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou d'un traitement localisé ou seulement pour éliminer les punaises des lits. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

Pour éliminer les punaises des lits : NE PAS appliquer sur les matelas, les têtes et pieds de lit ou les meubles. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et des moulures et en arrière de celles-ci; et sur des parties localisées des murs et des planchers en arrière des meubles (p. ex. lits, tables de chevet). Pour accroître l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les punaises des lits dans la mesure du possible.

Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

MISES EN GARDE :

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer le contenant dans l'eau chaude ni près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur ou entreposer à des températures dépassant 50 °C. Couvrir les aquariums lorsqu'on traite une pièce. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Se laver après avoir utilisé le produit. Craint le gel.

ÉLIMINATION :

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle, puis jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

2019-7137

2020-07-30

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.