

2014-1141
2014-04-09

Docteur Létal
puissance maximale
Éliminateur de punaises des lits
– format de voyage

INSECTICIDE DE CONTACT À EFFET RÉMANENT SOUS PRESSION

PAS DE CFC

DOMESTIQUE

Tue les punaises des lits

GARANTIE :
Perméthrine 0,25 %

N° D'HOMOL. 30874 L.P.A.

CONTENU NET : 75-775 grammes

ATTENTION EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

753146 AB Ltd. o/a UltraSol Industries*
10755-69, Avenue
Edmonton (Alberta) Canada
T6H 2C9
1-780-432-6535

*Société appartenant entièrement à des intérêts canadiens et exploitée par des Canadiens

Pour usage comme traitement localisé ou traitement de fentes et crevasses pour éliminer les punaises des lits.

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Ce contenant possède une valve spéciale qui permet de pulvériser le produit dans toutes les directions, même à l'envers, sur les endroits difficiles à atteindre lors des traitements dans les fentes et fissures.

DIRECTIVES GÉNÉRALES : Avant de procéder à une application complète, faire un essai du produit sur un endroit non apparent de la surface à traiter pour voir s'il entraîne une décoloration ou des taches. Ne pas appliquer sur les rideaux, le papier peint ni les matériaux semblables qui pourraient se tacher. Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter, puis pulvériser le produit pour bien mouiller la surface mais pas jusqu'au ruissellement. Les applications complètes produisent une couche de vapeur qui pénètre dans les fentes et les crevasses pour éliminer les insectes. En cas de réinfestation, répéter l'application au besoin. Sur les surfaces de béton non-peintes ou non-scellées, une application supplémentaire, deux semaines plus tard, peut s'avérer nécessaire. Assurer une ventilation adéquate après avoir utilisé le produit à l'intérieur. **GARDER LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE À L'ÉCART DES SURFACES TRAITÉES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT SÈCHES.** Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance.

Punaises des lits : Pulvériser le produit directement dans les fentes et fissures où se trouvent ou peuvent se cacher ces ravageurs, le long et derrière les plinthes, moulures et espaces de plancher sous les objets (p. ex., sous le lit et les tables de nuit). Appliquer le produit directement sur les insectes si possible. Ne pas appliquer sur le matelas, la tête ou le pied de lit ni sur tout autre mobilier. Ne pas utiliser dans les aires d'entreposage des aliments ou sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments.

MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. Contenu sous pression. Ne pas placer le contenant dans l'eau chaude ni près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur ou entreposer à des températures dépassant 50 °C. Couvrir les aquariums et éloigner les animaux de compagnie pendant une heure lorsqu'on traite une pièce. Dans les habitations, enlever ou couvrir toute nourriture exposée et les ustensiles de cuisson avant le traitement. Après le traitement, laver toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Se laver après avoir utilisé le produit. Craint le gel.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression résiduelle, puis jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.

PREMIERS SOINS :

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-

bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Traiter selon les symptômes.