

K-G

INSECTIFUGE EN VAPORISATEUR À POMPE 7.5%

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les mouches à chevreuil (chrysops, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots, les aoûtats (rougets).

[contient de l'aloès]

[non parfumé]

[parfumé]

[non gras]

[Défense familiale jusqu'à 3 heures]

PRINCIPE ACTIF : DEET plus toluamides apparentés actifs 7.5%

NO. D'HOM. 27606 LOI P.A.

CONTENU NET: 25 mL - 1L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION



INFLAMMABLE

K-G PACKAGING INC.  
8001 Keele Street  
Vaughan, Ontario L4K 1Y8  
905 669-9855

[copie alternative de l'étiquette]

2 x 25-1000 mL

3 x 25-1000 mL

4 x 25-1000 mL

5 x 25-1000 mL

6 x 25-1000 mL

[Copie alternative de marketing]

- Défense familiale
- Emballage multiple Défense familiale
- Emballage multiple pour enfants et famille
- Trousse Défense familiale
- Trousse insectifuge Défense familiale
- Trousse pour enfants et famille
- Trousse insectifuge pour enfants et famille
- Emballage double Défense familiale
- Emballage double insectifuge Défense familiale
- Emballage double pour enfants et famille
- Emballage double insectifuge pour enfants
- Insectifuge paquet double
- Insectifuge paquet triple
- Insectifuge paquet de quatre
- Insectifuge paquet de cinq
- Insectifuge paquet de six
- Emballage double Défense familiale
- Emballage double pour enfants et famille
- Emballage triple Défense familiale
- Emballage triple pour enfants et famille
- Emballage de quatre Défense familiale
- Emballage de quatre pour enfants et famille
- Emballage de cinq Défense familiale
- Emballage de cinq pour enfants et famille
- Emballage de six Défense familiale
- Emballage de six pour enfants et famille
- Contient deux insectifuges en vaporisateur à pompe [marque]
- Contient trois insectifuges en vaporisateur à pompe [marque]
- Contient quatre insectifuges en vaporisateur à pompe [marque]
- Contient cinq insectifuges en vaporisateur à pompe [marque]
- Contient six insectifuges en vaporisateur à pompe [marque]

Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, ce produit antiparasitaire repousse les tiques qui peuvent (porter) (transmettre)] la maladie de Lyme

Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, ce produit antiparasitaire repousse les moustiques qui peuvent (porter) (transmettre)] le virus du Nil occidental

Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, ce produit antiparasitaire repousse les tiques qui peuvent (porter) (transmettre)] la maladie de Lyme et les moustiques qui peuvent (porter) (transmettre)] le virus du Nil occidental.

**MODE D'EMPLOI :** Repousse les moustiques (maringouins) pendant 3 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les petits âgés de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains des enfants. Chez les enfants 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, plastiques et surfaces peintes.

**PREMIERS SOINS:**

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, le jeter dans les ordures ménagères.