

2012-1511
2012-06-13

<CO-OP Game Day Approved(logo)>

Chasse-Moustiques
(25% Deet)

BOUILLIE SOUS PRESSION
DOMESTIQUE

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches à chevreuil,
les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots et les aoûtats.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE: DEET plus toluamides apparentés actifs(isomères ortho & para)25%

NO. D'HOM. **30556** LOI P.A.

CONTENU NET : 230 g

DANGER



EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE



RISQUE
D'EXPLOSION

Federated Co-operatives Limited
401 – 22nd Street East
Saskatoon, S7K 0H2
1 866-888-9617

MODE D'EMPLOI : Repousse les moustiques (maringouins) pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, poêles ou autre source de chaleur. Ne pas percer ou jeter le contenant au feu ni conserver à une température de plus 50°C. Ne pas utiliser près d'une flamme vive, d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans. Éviter tout contact avec le plastique et les tissus tels que l'acétate, le rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, plastiques et surfaces peintes.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression et jeter dans les ordures ménagères.