

2014-0899
2014-12-09

ISOMATE® CM FLEX

PHÉROMONE DE CONFUSION SEXUELLE POUR CARPOCAPSE DE LA POMME
POUR UTILISATION SUR DES FRUITS À PÉPINS ET À NOYAU , LES NOIX ET LE NOYER CENDRÉ

DIFFUSEUR (PRODUIT À DÉGAGEMENT LENT)

AGRICOLE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AVERTISSEMENT - IRRITANT CUTANÉ

GARANTIE:	E,E-8,10-Dodécadièn-1-ol	52,96 %
	1-Dodécanol	29,73 %
	1-Tétradécanol	6,04 %

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 31589 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 400 diffuseurs par paquet (chaque diffuseur contient 172.28 mg de phéromone; pour un total de 68.91 g de phéromone par paquet)

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

14615 NE 13th Court, Suite A
Vancouver, Washington 98685 USA
Téléphone: 360-571-2247

MODE D'EMPLOI

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE L' ISOMATE CM FLEX SOIT APPLIQUÉ TEL QU'INDIQUÉ.

Les producteurs utilisant ce produit doivent maintenir des registres détaillés des dommages encourus à l'intérieur de leur verger. Le dépistage précis des populations adultes est essentiel puisque le mode d'utilisation de la ISO MATE CM FLEX est très différent du mode d'utilisation des insecticides conventionnels à large spectre homologué pour le contrôle de la carpocapse de la pomme. La réussite du programme de lutte avec ISOMATE CM FLEX dépend de la discussion continue avec les experts en lutte intégrée les conseillers horticoles et les représentants des compagnies de produits antiparasitaires.

CULTURES: Pommes, poires, coings et autres fruits à pépins; les noix et le noyer cendré; les pêches, les pruneaux, les prunes, les nectarines et les autres fruits pierre.

PARASITE: Carpocapse de la pomme (*Cydia pomonella*).

DOSE D'EMPLOI: Minimum de 500 diffuseurs à l'hectare (200 diffuseurs à l'acre). Maximum de 1000 diffuseurs à l'hectare (400 diffuseurs à l'acre). Appliquer le taux maximal des distributeurs dans les vergers qui sont moyen à haut risque, tels que modérée à fortement infestées aux vergers ou tout verger adjacent à un verger non traitées. Doubler la dose de diffuseurs en bordure du verger.

APPLICATION: Placer les distributeurs sur les branches latérales dans le tier supérieur de l'arbre. Appliquer les distributeurs uniformément dans la zone traitée.

PERIODE D'UTILISATION: Installer les diffuseurs avant l'émergence des papillons adultes au printemps. Consulter votre consultant en lutte antiparasitaire ou un représentant Pacifique de Biocontrol pour la longévité prévue de distributeur dans votre secteur ou pour déterminer la période d'application.

NOTE: Isomate CM Flex réduit l'accouplement des organismes nuisibles ciblés. L'immigration femelles fécondées jointes de ces espèces des vergers adjacents réduira le niveau de contrôle. Contrôler par:

- Traitement des sources extérieures d'infestation avec du Isomate CM Flex.
- Traitement des sources extérieures d'infestation avec un insecticide homologué.
- Traitement du verger traité avec la phéromone avec un insecticide homologué.

Il est plus efficace de traiter toute la zone. Des applications supplémentaires d'un insecticide homologué sont conseillées lorsque l'Isomate CM Flex est employé dans les vergers ayant de fortes populations de parasites. Tous les insectes nuisibles doivent être suivis de façon à ce que des insecticides homologués puissent être appliqués au moment opportun.

ISOMATE® est une marque déposée de "Pacific Biocontrol Corporation".

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas ouvrir les enveloppes de papier d'argent jusqu'à ce qu'il soit prêt à utiliser. Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements. Provoque une irritation de la peau. ÉVITER TOUT contact avec la peau. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des lunettes de protection, des chaussures et des chaussettes. Se laver les mains avec du savon et de l'eau après l'emploi.

Ne pas contaminer l'eau d'irrigation ou l'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Ne pas jeter les diffuseurs, dans ou près des étendues d'eau.

ENTREPOSAGE: Entreposer les paquets de diffuseurs non-ouverts à une température inférieure à 4°C dans un endroit sec.

ÉLIMINATION DU PRODUIT: Les diffuseurs inutilisés qui ne peuvent pas être utilisés selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette doivent être éliminés conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS: Éliminer les contenants vides et les enveloppes de papier d'argent conformément à la réglementation provinciale.

GÉNÉRAL: Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se débarrasser, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.