

2023-4546
2023-08-28

(Étiquette du distributeur d'appâts)

**GREEN WAY™
APPÂT GELÉE POUR FOURMIS**

Prêt à utiliser ou rechange (facultatif)
Image d'une fourmi (facultatif)

Sans dégât – Pas de fourmis
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Formule honeydew

DOMESTIQUE
INSECTICIDE
Pâte

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Bore 0,61 % (présent sous forme de tétraborate de disodium décahydraté)

N° D'HOMOL. 30173 L.P.A.
CONTENU NET : seringue de 42,5 g

Innovative Pest Control Products
5745 SW 75th Street #191
Gainesville, FL 32608
1 561-350-9998

(Étiquette de l'emballage)

**GREEN WAY™
APPÂT GELÉE POUR FOURMIS**

Prêt à utiliser ou rechange (facultatif)
Image d'une fourmi (facultatif)

Sans dégât – Pas de fourmis
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Formule honeydew

DOMESTIQUE
INSECTICIDE
Purée

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Bore 0.61 % (présent sous forme de tétraborate de disodium décahydraté)

N° D'HOMOL. 30173 L.P.A.

CONTENU NET :

Seringue de 42,5 g [1 à 6 seringues par boîte]

Innovative Pest Control Products
5745 SW 75th Street #191
Gainesville, FL 32608
1 561-350-9998

GREEN WAY™ APPÂT GELÉE POUR FOURMIS

GREEN WAY™ APPÂT GELÉE POUR FOURMIS incorpore du bore (sous forme de borax) à un appât alimentaire spécial très appétissant pour les fourmis. Les fourmis ramassent l'appât puis le ramènent au nid pour nourrir la colonie. L'action du bore est lente, il faut donc mettre suffisamment d'appât pour assurer une distribution continue. Après avoir consommé l'appât, les fourmis retournent au nid puis nourrissent les portées et la reine, détruisant ainsi la colonie. Continuer de placer l'appât jusqu'à ce que l'on obtienne une suppression satisfaisante.

Ne pas utiliser de pulvérisateur, de nébulisateur ni d'aucun produit chimique ou nettoyant près des contenants d'appâts ou des mises en place. Cela risquerait de contaminer l'appât, et les insectes cesseraient donc de s'en nourrir.

Pour supprimer les fourmis, utiliser le produit à l'intérieur comme à l'extérieur près des maisons, des appartements et des condominiums.

MODE D'EMPLOI :

GREEN WAY™ APPÂT GELÉE POUR FOURMIS s'applique au moyen de la seringue. Sortir une seringue de l'emballage et injecter la gelée dans les fentes et fissures autour des fenêtres et portes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Utiliser le produit le long des plinthes et des vides de murs, là où l'appât est protégé des éléments et inaccessible aux enfants et aux animaux de compagnie. Déposer le produit en grains de la grosseur d'un pois dans les fentes et fissures où les fourmis sont présentes, jusqu'à cinq placements par mètre. Chaque seringue couvre environ 8 mètres.

La seringue **GREEN WAY™ APPÂT GELÉE POUR FOURMIS** peut aussi servir à injecter la gelée dans des appareils qui permettent aux fourmis d'entrer, mais qui cachent l'appât des humains, des animaux domestiques et des éléments. L'appât peut servir à remplir les distributeurs d'appât vendus avec l'appât ou les distributeurs d'appât pour fourmis conçus pour l'ajout d'appât (c'est-à-dire Ant Café ou autre distributeur d'appât semblable). (Facultatif)

(Illustration – facultatif)

GREEN WAY™ APPÂT GELÉE POUR FOURMIS

À l'intérieur : Placer les pièges à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis sont nombreuses. Remplacer les pièges au besoin. Placer les pièges sous les armoires à aliments, éviers, cuisinières, réfrigérateurs, aires d'entreposage des aliments, greniers, garages, sous-sols, aires d'entreposage et garde-robes. Pour empêcher les fourmis d'entrer dans l'habitation, placer le piège sur l'extérieur des appuis de fenêtre et dans les entrées de porte. Certains distributeurs d'appât sont conçus pour être fixés à un mur ou placés sur une surface plane. Lorsqu'on utilise un distributeur d'appât, se laver les mains à fond avant de le manipuler afin d'éliminer toute odeur qui pourrait repousser les fourmis, p. ex., tabac, ail, produits chimiques/nettoyants.

À l'extérieur : Placer les pièges à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres près des endroits par où les fourmis pénètrent dans les habitations. Pour obtenir les meilleurs résultats, placer les distributeurs dans des endroits ombragés ou créer de l'ombrage pour le distributeur d'appât. [Chaque fois qu'il est possible, éviter de placer le distributeur d'appât dans un endroit en plein soleil.] (Facultatif)

MISES EN GARDE : Appliquer seulement dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES**. Éviter de contaminer l'eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver après avoir utilisé le produit.

PREMIERS SOINS :

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.