

2018-0940
2018-05-09

WILSON®
BUG-X®
SAVON INSECTICIDE
CONCENTRÉ

INSECTICIDE

À MÉLANGER AVEC DE L'EAU

Pour supprimer les insectes sur les fruits,
légumes, fleurs, plantes ornementales, arbres et arbustes
d'une façon efficace.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 31141 LOI P.A.

GARANTIE : savon (sels de triéthanolamine d'acides gras) 25 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 mL – 1 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.,
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

2018-0940
2018-05-09

DUR pour les INSECTES.
DOUX pour vos PLANTES et VOUS.

MODE D'EMPLOI :

Insectes supprimés : cochenilles, aleurodes, perce-oreilles, psylles, pucerons, tenthrèdes-limaces du rosier, tenthrèdes-squeletteuses du cerisier et tétranyques.

Mélange : Remuer une partie de Wilson® Bug-X® Savon Insecticide Concentré dans 20 parties d'eau, c'est-à-dire 50 mL de concentré de savon par litre d'eau (2 c. à soupe par chopine).

Pulvérisation : Se servir d'une pulvérisation fine pour couvrir complètement les deux côtés des feuilles et des tiges.

Immersion : Les petites plantes en pots peuvent être retournées à l'envers, en se servant d'une main pour retenir le terreau, plongées ou lavées doucement dans une solution de Wilson® Bug-X® Savon Insecticide Concentré mélangée à raison de 50 mL par litre d'eau à la température ambiante.

Quand l'appliquer : Utiliser une fois par semaine jusqu'à ce qu'on observe une bonne répression.

N'EST PAS recommandé pour les fougères, capucines et pois de senteur. En cas de doute concernant la réaction de toute plante délicate, tels les **rosiers, semis ou plants repiqués**, effectuer un pré-test en appliquant sur plusieurs feuilles. Attendre suffisamment de temps avant de traiter la plante entière afin de confirmer qu'aucun dommage ne résulte de l'utilisation de ce produit. Ne jamais pulvériser sur des fleurs épanouies. Ne pas appliquer en plein soleil ou lorsqu'il fait très chaud.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler le contenant vide.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.pthomeandgarden.com

Wilson® et Bug-X® sont des marques de commerce enregistrées de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

2018-0940
2018-05-09

OPTIONAL TEXT:

Employer à l'intérieur et dans les serres sur les plantes d'appartement, et à l'extérieur sur les fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales.