

2014-2476 2014-07-18

Panneau avant

**ZODIAC POWER BAND PLUS BREAKAWAY
Double Action Collier antipuces & antitiques pour chats et chatons**

**(collier blanc)
Générateur à décharge lente**

Tue :
les puces adultes
les tiques adultes
et tue
les œufs de puces
pendant 7 mois

GARANTIE :
Tétra chlorvinphos.....14,55 %
(S)-méthoprène.....1,02 %
Avertissement, contient l'allergène soya.

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N'UTILISER QUE SUR LES CHATS

N° D'HOMOL. 31446 L.P.A.

CONTENU NET : g

Wellmark International
100 Stone Road West, Suite 111
Guelph, Ontario
N1G 5L3
1-800-263-2740

Panneau arrière

MODE D'EMPLOI

Ne PAS retirer le collier de son emballage jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi. Retirer le collier de l'emballage; le dérouler puis l'ÉTIRER pour l'activer. Cela libère la matière active au moment de l'utilisation et lui assure sa pleine efficacité. Placer le collier autour du cou du chat, laissant deux doigts de jeu entre le collier et le cou de l'animal, puis boucler le collier. Prévoir 5 à 8 cm de longueur de collier supplémentaire pour ajustement. Couper toute longueur de collier excédentaire; envelopper et jeter le morceau avec les ordures ménagères. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le collier.

Lorsque le collier est porté la première fois, examiner la région du cou de l'animal à quelques jours d'intervalle pour vérifier s'il y a de l'irritation ou des effets indésirables. Ne PAS utiliser le produit sur les chats âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités avec un autre pesticide. Pour assurer une protection ininterrompue lorsqu'il y a un risque permanent d'infestation, remplacer le collier tous les 7 mois. Dans des conditions où le chat est exposé à des infestations graves de puces ou de tiques, il peut s'avérer nécessaire de remplacer le collier plus souvent. Ne pas remplacer ce collier plus d'une fois tous les 3 mois. Pour usage lorsque les puces et les tiques posent un problème. Lorsqu'il s'agit uniquement d'un problème de tiques, utiliser plutôt un collier sans régulateur de croissance d'insectes. CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux environnants. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les insectes continue à poser un problème.

MISES EN GARDE

PERSONNES : Ne pas laisser les enfants manipuler ce collier. Ne pas dérouler le collier avant d'être prêt à s'en servir. Ce collier est destiné à servir de diffuseur d'insecticide seulement. De la poussière se forme sur le collier durant l'entreposage. La poussière peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Le collier est nocif s'il est mâché, ou si les poussières sont inhalées ou absorbées par la peau. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les poussières du collier. Après avoir manipulé ou utilisé le produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entré en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Empêcher le produit d'entrer en contact avec les aliments, les ustensiles de cuisine et les endroits où l'on prépare ou entrepose la nourriture. ANIMAUX DE COMPAGNIE : Les poussières peuvent irriter les yeux, le nez et la gorge. Il est nocif de mâchouiller ou d'avaler le collier. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chat. Empêcher l'animal d'inhaler les poussières du collier.

Ne pas utiliser ce produit sur un chat en même temps ou dans les 30 jours précédant ou suivant le traitement avec un médicament ou l'exposition à des pesticides ou des produits chimiques qui inhibent la cholinestérase.

PREMIERS SOINS

PERSONNES : Si le collier est MÂCHOUILLÉ : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **CONTACT DES POUSSIÈRES DU COLLIER AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, enlever le collier et baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Si le collier a été avalé ou mâché, consulter un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient un pesticide inhibiteur de la cholinestérase (composé anticholinestérasique). Les symptômes de l'intoxication humaine peuvent comprendre des maux de tête, des faiblesses, des sueurs, une vision trouble, des nausées et de la diarrhée. Obtenir des soins médicaux ou appeler un centre antipoison immédiatement. L'atropine est un antidote. Les symptômes aigus d'une surdose chez le chat comprennent la diarrhée, la salivation, les vomissements, les tremblements musculaires et la faiblesse. Consulter immédiatement un vétérinaire.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer le produit dans le contenant d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Envelopper et éliminer tout morceau de collier en trop, les emballages et les colliers non voulus (ayant servi) avec les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le sachet vide.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))