

2020-02-14  
2019-2026

Hartz UltraGuard  
Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots  
pesant entre 14 kg et 28 kg

Tue les puces (adultes) et les tiques pour une durée maximale de 30 jours  
Réduit les piqûres de moustiques pour une durée maximale de 30 jours

Réserve de 1 mois  
Réserve de 2 mois  
Réserve de 3 mois  
Réserve de 4 mois  
Réserve de 5 mois  
Réserve de 6 mois

DOMESTIQUE

SOLUTION

PRINCIPE ACTIF : ..... d-phénothrine 85,70 %

Avertissement, contient l'allergène soya.

N° D'HOMOL. 30734 L.P.A.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHIOTS  
NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHIOTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 SEMAINES  
NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHIENS OU DES CHIOTS PESANT MOINS  
DE 14 KG

CONTENU NET :  
Contient 1-6 tubes de 4,1 mL chacun

Hartz Canada, Inc.  
1125, rue Talbot  
St. Thomas (Ontario) N5P 3W7  
1 800 275-1414

## **NE PAS UTILISER SUR LES CHATS**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLET AVANT CHAQUE UTILISATION. N'UTILISER CE PRODUIT QUE SUR LES CHIENS ET LES CHIOTS ÂGÉS D'AU MOINS 12 SEMAINES. NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHIENS OU DES CHIOTS PESANT MOINS DE 14 KG.**

### **MISES EN GARDE**

#### **RISQUES POUR LES HUMAINS :**

Cause une irritation modérée des yeux. Éviter tout contact avec les yeux et les vêtements. Après la manipulation ou l'application du produit, et avant de manger, boire, mâcher de la gomme ou fumer, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) soigneusement avec de l'eau et du savon.

#### **RISQUES POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE :**

##### **NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR DES CHATS OU DES CHATONS.**

Ne pas utiliser ce produit sur des chiots âgés de moins de **12** semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent, ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation, telle qu'une légère rougeur temporaire de la peau à l'endroit de l'application. Les animaux de plus petite taille sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Observer l'animal attentivement. Prendre soin d'empêcher l'exposition de l'animal traité aux autres animaux de compagnie qui peuvent être en contact direct avec celui-ci.

S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau et consulter immédiatement un vétérinaire. Si le produit a été avalé ou mâché, consulter un vétérinaire.

**Effets secondaires :** Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Hartz Canada, Inc au 1-800-275-1414.

**RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT :** Ce produit est toxique pour les poissons. Toxique pour les organismes aquatiques.

#### **PREMIERS SOINS :**

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

**Pour obtenir d'autres renseignements sur ce pesticide (y compris des préoccupations sur la santé, les urgences médicales ou un incident mettant en cause le produit), composez le 1 800 275-1414.**

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**MODE D'EMPLOI :**

Ce produit contient d-phénothrine. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent d-phénothrine après avoir utilisé ce produit.

Ne pas utiliser dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

N'utiliser que sur les chiens et les chiots âgés d'au moins 12 semaines et qui pèsent entre 14 et 28 kg.

NE PAS administrer par la gueule. Ne pas utiliser ce produit sur les chats. Ne pas utiliser ce produit sur des chiots âgés de moins de 12 semaines. Ne pas utiliser ce produit sur des chiens ou des chiots qui pèsent moins de 14 kg. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent, ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. **CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

**APPLICATEUR 1**

1. Le chien doit être sec au moment de l'application.
2. Sortir un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale et orienté loin du visage.
3. Enlever le capuchon. Renverser le capuchon et le placer sur l'ouverture du tube.
4. Appuyer sur le capuchon pour briser le sceau. Enlever soigneusement le capuchon.
5. Placer le bout du tube sur le dos du chien, entre les omoplates. Séparer les poils du chien à l'aide du bout du tube afin d'appliquer le produit sur la peau. Faire sortir le contenu du tube pour former une bande partant des omoplates, allant le long du dos du chien et jusqu'au bas de la queue. La zone traitée peut paraître mouillée ou huileuse après l'application.
6. Après l'application, observer attentivement l'animal pour toute réaction au traitement. Consulter la section MISES EN GARDE sur la présente étiquette pour obtenir d'autres informations.

**APPLICATEUR 2**

1. Le chien doit être sec au moment de l'application.
2. Sortir un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale et orienté loin du visage.
3. Soulever [la poignée][le levier][au col du tube] vers le haut pour [la][le] séparer [du corps du tube].
4. Placer le bout du tube sur le dos du chien, entre les omoplates. Séparer les poils du chien à l'aide du bout du tube afin d'appliquer le produit sur la peau.

5. Faire sortir le contenu du tube pour former une bande partant des omoplates, allant le long du dos du chien jusqu'au bas de la queue. La zone traitée peut paraître mouillée ou huileuse après l'application.
6. Après l'application, observer attentivement l'animal pour toute réaction au traitement. Consulter la section MISES EN GARDE sur la présente étiquette pour obtenir d'autres informations.

#### Remarques supplémentaires

1. Ne pas utiliser ce produit plus d'une fois par mois. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible.. Faire une nouvelle application tous les mois pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles..
2. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.
3. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire.

**ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :** Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, loin des aliments et hors de la portée des enfants. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Pour en savoir plus, appelez nos spécialistes au 1 800 275-1414.

Visitez [www.hartzultraguard.com](http://www.hartzultraguard.com)

Hartz® et toute autre marque de commerce sont des marques de commerce de The Hartz Mountain Corporation.

Fabriqué aux États-Unis pour Hartz Canada, Inc.

1125, rue Talbot

St. Thomas (Ontario) N5P 3W7

1 800 275-1414

Hartz UltraGuard

Traitement antipuces et antitiqes pour chiens et chiots  
pesant entre 14 kg et 28 kg

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : ..... d-phénothrine 85,70 %

Avertissement, contient l'allergène soya.

**NE PAS UTILISER SUR LES CHATS**

N° D'HOMOL. 30734 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE DE CARTON AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET : 4,1 mL

Hartz Canada, Inc.  
1 800 275-1414