

2014-5092  
2014-11-21

**CO-OP GOLD <LOGO>**

INSECTIFUGE EN VAPORISATEUR À POMPE 25%

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets).

GARANTIE : DEET plus toluamides actifs apparentés 25%

NO. D'HOM. 31577 LOI P.A.

ATTENTION



INFLAMMABLE

CONTENU NET: 50 mL -1 Litre

Federated Co-operatives Limited  
401 – 22nd Street East  
Saskatoon, S7K 0H2  
1 866-888-9617

**MODE D'EMPLOI :** Repousse les moustiques (maringouins) pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale, à une distance de 15 à 20 cm, et vaporiser les vêtements et la peau exposée à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos. Se laver les mains après l'application.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas vaporiser à proximité d'une flamme nue, d'une étincelle ou lorsque vous fumez. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche, les coupures, les blessures et la peau brûlée par le soleil. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans. ÉVITER le contact avec le plastique, les cristaux de montre et les tissus de synthèse comme l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager le cuir, les finis à meuble, les plastiques et les surfaces peintes.

**PREMIERS SOINS :**

S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale.

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, le jeter dans les ordures ménagères.