

2018-03-23

2017-4062

Sawyer Icaridine insectifuge en vaporisateur à pompe

DOMESTIQUE

SOLUTION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF :

Icaridine..... 20 %

N° D'HOM. 33032 L.P.A.



INFLAMMABLE

ATTENTION --- IRRITANT OCULAIRE

CONTENU NET : _____ml

Sawyer Products, Inc.
P.O. Box 188
Safety Harbor, FL 34695
1 800 356-7811

MODE D'EMPLOI : Tenir le contenant à 6 à 15 centimètres de la peau en pulvérisant la solution en prenant soin de ne pas pulvériser en direction du visage. Utiliser juste assez de répulsif pour humecter la peau exposée. Éviter d'appliquer ce produit en excès. Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas pulvériser directement sur le visage. Appliquer sur le visage en vaporisant d'abord une petite quantité dans les paumes des mains et répandre sur le visage et le cou. Ne pas appliquer près des yeux ou de la bouche. Appliquer la solution en petites quantités autour des oreilles. L'application fréquente et en grande quantité n'est pas nécessaire pour que le produit soit efficace. Ne pas appliquer sur une peau trop brûlée par le soleil. Ne pas pulvériser dans les endroits clos. Renouveler l'application si nécessaire après 12 heures de protection contre les moustiques et les tiques. Ne dépassez pas deux applications par jour.

PRÉCAUTIONS : Superviser l'application sur les enfants. Ne pas pulvériser la solution sur les mains des jeunes enfants. Ne pas employer sur les nourrissons de moins de 6 mois. Provoque une irritation modérée des yeux. Éviter le contact avec les yeux, la bouche, les blessures, les coupures et la peau irritée.

Inflammable, ne pas ranger ce produit près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas fumer lors de l'application.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le produit dans un lieu frais et sec, hors de la portée des enfants. Tenir à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

ÉNONCÉS OPTIONNELS DE MARKETING

- Repousse les moustiques et les tiques pendant douze heures
- Jusqu'à 12 heures de protection contre les moustiques et les tiques.
- Protection efficace et durable [pendant][:] 12 heures contre les moustiques et les tiques.
- S'utilise avec confiance sur toute la famille.
- Non huileux
- Non gras
- Non collant
- Insectifuge
- Vaporisateur à pompe
- Repousse les moustiques
- Formule du pêcheur
- [N'endommage] N'endommagera pas les lignes à pêche ou [d'autres] matériaux synthétiques
- N'endommage (N'endommagera) pas l'attirail et l'équipement.
- [N'endommage] N'endommagera pas les plastiques et les tissus
- Inodore
- Inodore après l'application
- Insectifuge en vaporisateur à pompe