

**Panneau avant**

Hartz First Defense OneSpot Traitement pour chats et chatons

Tue les œufs de puces avant l'éclosion  
Empêche la prolifération de puces

Réserve de 1 mois  
Réserve de 2 mois  
Réserve de 3 mois  
Réserve de 4 mois  
Réserve de 5 mois  
Réserve de 6 mois

PRINCIPE ACTIF : (S)-Méthoprène.....3,6 %

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AU COMPLÈTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N'UTILISER QUE SUR LES CHATS ET CHATONS

N° D'HOMOL. 32717 LPA

Contenu net : 1-6 tubes de 1 mL chacun

Hartz Canada, Inc.  
1125, rue Talbot,  
St. Thomas (Ontario)  
N5P 3W7  
1-800-275-1414

## Panneau arrière

### **MODE D'EMPLOI :**

Ce produit contient (S)-méthoprène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent (S)-méthoprène après avoir utilisé Hartz First Defense OneSpot Traitement pour chats et chatons.

1. Retirer un tube applicateur de l'emballage et le tenir en position verticale.
2. Enlever le capuchon. Renverser le capuchon et le placer sur l'embout du tube.
3. Appuyer sur le capuchon afin de briser le sceau de l'embout.
4. Enlever soigneusement le capuchon. Positionner l'embout du tube sur le dos du chat, entre les omoplates, et vider tout le contenu du tube.
5. Répéter chaque mois.

Ne pas utiliser ce produit plus d'une fois par 4 semaines. Faire une nouvelle application tous les mois pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles. Ne pas utiliser ce produit sur des chats ou des chatons âgés de moins de 12 semaines. Ne PAS administrer par la gueule. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. **CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

### **MISES EN GARDE :**

**PERSONNES** : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation des yeux. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc lors de l'application. Éviter tout contact avec l'animal de compagnie tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : Nocif en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chat. Il faut prendre soin d'empêcher toute exposition des autres animaux de compagnie qui peuvent être en contact direct avec l'animal traité. Les animaux de plus petite taille sont davantage sujets à des effets indésirables. Observer attentivement.

**Effets secondaires:** Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Hartz Canada, Inc. au 1-800-275-1414.

### **PREMIERS SOINS**

**PERSONNES** :

**INGESTION** : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS** : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **CONTACT AVEC LES YEUX** : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION** : Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des aliments et hors de la portée des enfants. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères.

Pour en savoir plus, appelez nos spécialistes au 1-800-275-1414

Visitez [www.hartzultraguard.com](http://www.hartzultraguard.com)

Hartz® et autres marques de commerce sont des marques de commerce de The Hartz Mountain Corporation

Fabriqué aux États-Unis pour Hartz Canada, Inc. 1125, rue Talbot, St. Thomas (Ontario) N5P 3W7

**TEXTE FIGURANT SUR LE TUBE**

Hartz First Defense OneSpot Traitement pour chats et chatons

DOMESTIQUE

(S)-Méthoprène.....3,6 %

N° D'HOMOL. 32717 LPA

LIRE L'ÉTIQUETTE DU CARTON AVANT L'UTILISATION

Contenu net : 1 mL

Hartz Canada, Inc.