

2020-10-30
Sub.No. 2020-4718

[FRONT PANEL - FRENCH]

L'homologation de ce produit a été révoquée le 30 mai 2023. La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

<Brand>

CRAB ARREST

Granulaire

[Traitement de prélevée inhibiteur de germination des graines de pissenlit et de digitale sanguine avec gluten de maïs]

[Pour inhiber la germination des graines de pissenlit et de digitale sanguine dans les gazons où prédominent l'ivraie et le pâturin des près vivaces établis]

Avec Sans

[images to show treatment with and without]

[Inhibiteur de germination en prélevée des graines de pissenlit et de digitale sanguine]

[APPLIQUER AU DÉBUT DU PRINTEMPS ET À LA FIN DE L'ÉTÉ AVANT
L'APPARITION DES MAUVAISES HERBES]

[AGIT DÈS LA PREMIÈRE APPLICATION OU VOUS SEREZ REMBOURSÉ!]

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Farine de gluten de maïs 84,975 %

N° D'HOMOL. 32210 L. P. A.

ATTENTION IRRITANT POUR LES YEUX
AGENT SENSIBILISANT POTENTIEL

5-25 kg

Evergreen BioInnovations Ltd.
651 Harwood Ave. N., Unit 3
Ajax, ON Canada
L1Z OK4 905-683-7556

[BOTTOM & SIDE GUSSET – FRENCH]

CRAB ARREST

[BACK PANEL – FRENCH]

CRAB ARREST

CRAB ARREST peut inhiber la germination des graines de pissenlit et de digitale sanguine lorsqu'il est appliqué de concert avec un programme sain d'entretien du gazon. Le pissenlit et la digitale sanguine établis au moment du traitement ne seront pas inhibés. Ce produit est préparé pour l'usage dans les gazons résidentiels où prédominent l'ivraie et le pâturin des prés vivaces établis.

MODE D'EMPLOI :

[MODE D'EMPLOI :

Peut inhiber la germination des graines de pissenlit et de digitale sanguine dans les pelouses constituées essentiellement d'ivraie vivace et de pâturin des prés établis.

- Ne pas utiliser avec un engrais contenant de l'azote.
- Si le pissenlit et la digitale sanguine sont établis au moment de l'application, ils ne seront pas supprimés. L'action inhibitrice du produit sur les graines de mauvaises herbes se dissipe habituellement cinq semaines après l'application.
- Ne pas appliquer le produit par temps venteux.
- Ne pas appliquer le produit sur le gazon nouvellement semé car il risque d'inhiber la germination de la semence. Attendre plutôt après la première tonte, lorsque les racines du gazon sont établies.
- Ne pas appliquer ce produit si vous semez ou posez du nouveau gazon en plaques au printemps ou à l'automne.
- Peut inhiber la germination des graines de mauvaises herbes lorsqu'il est utilisé conjointement avec un solide programme d'entretien de pelouse.

Avant d'appliquer

- Calculez la surface à traiter; mesurez la longueur et la largeur en mètres ou en pieds, puis multipliez les deux pour obtenir la surface en mètres ou en pieds carrés (longueur x largeur).
Ensuite, soustrayez les surfaces non couvertes de pelouse.
- Pour des résultats optimaux, appliquer avec un épandeur Scotts® au réglage recommandé.
- N'appliquez pas près de l'eau, des collecteurs pluviaux ou des fossés d'irrigation ou de drainage. N'appliquez pas si des averses abondantes sont prévues. Appliquez ce produit uniquement sur la pelouse et balayez vers la pelouse tout produit qui se retrouve sur l'entrée, le trottoir ou la rue.

[illustration]
CALCULEZ LA SURFACE À TRAITER

➤ **Remplir et régler**



➤ **RÉGLAGES DE L'ÉPANDEUR :**

Épandeur	Réglage
Épandeurs à la volée/rotatifs Scotts® Appliquer sur une bande aux deux extrémités de la pelouse, puis se déplacer dans le sens de la longueur. Fermer l'épandeur chaque fois que vous atteignez une bande à l'extrémité. Faire chaque passage à 1,5 mètre (5 pi) l'un de l'autre de façon qu'ils se chevauchent.	15 (Passez sur la pelouse deux fois)
Épandeur par gravité Scotts® Tondre d'abord la pelouse. Appliquer sur une bande aux deux extrémités de la pelouse, puis se déplacer dans le sens de la longueur en chevauchant les marques de roues.	17 (Passez sur la pelouse trois fois)

➤ *[Illustration of spreading patterns]*

- Si l'épandeur utilisé n'est pas un produit Scotts®, appliquer 11.25 kg par 100 m² (23 lb par 1 000 pi²).

Période d'application

- Appliquer au printemps avant la germination des graines de pissenlit et de digitale sanguine.
- Pour des résultats optimums : Appliquer sur les pelouses établies deux fois par année : une première fois au début du printemps, deux semaines avant la germination des graines de mauvaises herbes, et une seconde fois à la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque les grandes chaleurs sont terminées.
- Appliquer le produit lorsque le sol est humide et lorsqu'on prévoit de la pluie dans les 2 jours suivant le traitement. S'il n'y a pas de pluie dans les 2 jours suivant le traitement, l'irrigation est requise. L'humidité excessive au moment du traitement peut rendre le produit moins efficace.

Mode d'application

• **Remplir et régler**

Réglez l'épandeur de façon à appliquer le produit à raison de 11,25 kg par 100 m² (23 lb par 1 000 pi²). Placez votre épandeur sur une entrée ou une autre surface pavée avant de le remplir, afin d'éviter tout déversement d'engrais sur le gazon. Assurez-vous que l'épandeur est fermé au moment de le remplir.

• **Appliquer**

Pour un épandage uniforme, commencez à marcher avant d'ouvrir l'épandeur, afin d'éviter de déverser de l'engrais au même endroit. Pour éviter les marques et les endroits non traités, épandez d'abord sur le périmètre de la pelouse puis faites des passages parallèles uniformes au centre. Pour une application uniforme, avancez à un rythme constant. **N'APPLIQUEZ JAMAIS À LA MAIN. Arrosez après l'application.]**

Ne pas appliquer le produit par temps venteux. Pour les applications au printemps et à la fin de l'été ou au début de l'automne, les dates d'application du produit peuvent varier d'une année à l'autre et selon les conditions météorologiques. En général, l'effet inhibiteur du produit sur les graines de mauvaises herbes se dissipe dans les cinq semaines suivant l'application. Appliquer CRAB ARREST sur une pelouse mature et qui possède une masse de racines bien développée. Ne pas appliquer le produit sur un gazon nouvellement ensemencé parce qu'il peut inhiber la germination des graines. Effectuer le traitement après la première tonte lorsque les systèmes racinaires sont établis. Ne pas appliquer le produit au printemps alors qu'on effectue un sursemis ou un nouvel engazonnement. De même, ne pas appliquer le produit à l'automne alors qu'on effectue un sursemis ou un nouvel engazonnement.

Pour de meilleurs résultats : Appliquer le produit sur un gazon établi deux fois par année, c'est-à-dire une fois au début du printemps et une fois à la fin de l'été ou au début de l'automne. Ce produit n'est pas recommandé pour l'usage avec un engrais qui contient de l'azote.

TRAITEMENT AU PRINTEMPS :

Inhibition du pissenlit et de la digitale sanguine :

La germination des graines de digitale sanguine se produit lorsque la température du sol atteint 12,8 °C. Appliquer sur l'ivraie et le pâturin des prés vivaces établis au début du printemps, deux semaines avant la germination des graines de digitale sanguine.

TRAITEMENT À LA FIN DE L'ÉTÉ OU AU DÉBUT DE L'AUTOMNE :

Inhibition du pissenlit et de la digitale sanguine :

Appliquer le produit sur l'ivraie et le pâturin des prés vivaces établis à la fin de l'été ou au début de l'automne, après le stress de chaleur.

DOSE D'APPLICATION :

Appliquer à raison de 11,25 kg/100 m².

MÉTHODE D'APPLICATION :

1. Mesurer la surface à traiter en multipliant la longueur et la largeur de la surface totale, en mètres. Un pas normal mesure environ un mètre. Mesurer la dimension de tout bâtiment ou voie d'accès de la même manière, et soustraire ces dimensions de la surface totale. Le reste représente la surface de gazon à traiter.
2. Pour les grandes surfaces, appliquer CRAB ARREST au moyen d'un épandeur rotatif. Pour les surfaces de moindre étendue, appliquer CRAB ARREST au moyen d'un épandeur manuel.
3. Appliquer CRAB ARREST en quadrillage. Utiliser la moitié de la dose dans chaque direction. Appliquer le produit lorsque le sol est humide et lorsqu'on prévoit de la pluie dans les 2 jours suivant le traitement. S'il n'y a pas de pluie dans les 2 jours suivant le traitement, l'irrigation est requise. L'humidité excessive au moment du traitement peut rendre le produit moins efficace.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une sensibilisation. CRAB ARREST ne doit pas être appliqué si la personne qui l'applique ou un membre du ménage est sensible ou allergique au maïs. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d'inhaler/de respirer les poussières. Comme mesure de bonne hygiène, porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures fermées et des gants lorsqu'on manipule le produit. De plus, on recommande de porter un masque anti-poussières lorsqu'on transfère le produit à l'épandeur et pendant le traitement.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans un endroit frais et sec, loin des semences, des engrais et autres pesticides.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter conformément à la réglementation provinciale ou municipale, le cas échéant. S'il n'y a pas de réglementation du genre, envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

[IMPORTANT : Suivez les directives indiquées sur ce produit d'entretien de la pelouse de qualité, car toute application excessive pourrait abîmer votre pelouse. Les taux d'application de l'épandeur peuvent varier selon l'état de l'épandeur, la vitesse d'application et l'inégalité de la surface traitée. Vérifiez l'épandeur avant de commencer et ajustez-le, au besoin. Consultez le manuel du propriétaire.]